herpy

DRZEWOŁAZY

Liściołaz żółty

Phyllobates terribilis

Phyllobates terribilis to największy z drzewołazów, 4-5 cm, a w naturze jedno z najbardziej toksycznych znanych zwierząt. Żyje wyłącznie na niewielkim skrawku lasu deszczowego na pacyficznym wybrzeżu Kolumbii. Zwierzęta z hodowli są praktycznie nietoksyczne, śmiałe i zawsze widoczne, a gatunek stał się jednym z najczęściej utrzymywanych drzewołazów w terrarystyce.

Rodzina: Dendrobatidae Nazwa angielska: Golden Poison Frog

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**4-5 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**8-15 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Toksyny skórne na wolności	**Silne**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 50 × 50 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**21-25 °C**
Temperatura w nocy	**18-21 °C**
Wilgotność	**70-100%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1-2 cm
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Owady i małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Dojrzałość płciowa	**16-20 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**10-30**
Czas do wyklucia	**10-25 dni** przy 22-24 °C
Okres larwalny	**30-60 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Pilnuje jaj i nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Zagrożony (EN)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Para *Phyllobates terribilis* potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 60 × 50 × 50 cm. Grupa 4-6 zwierząt potrzebuje co najmniej 90 × 50 × 50 cm, a więcej osobników wymaga większej powierzchni dna.
TEMPERATURA	W dzień powinno być 21-25 °C, najlepiej o kilka stopni cieplej w górnej części terrarium, a w nocy 18-21 °C, co odpowiada temperaturze pokojowej. Temperatura nie może przez dłuższy czas przekraczać 27 °C.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza musi być wysoka, 70-100 %, ale podłoże nie może zamienić się w bagno. Najprościej użyć systemu zraszającego, np. z trzema zraszaniami dziennie po 20-60 sekund, zależnie od dysz.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Zapewnij jedną lub kilka małych miseczek z około 2 cm wody, np. podstawki lub połówki łupin orzecha brazylijskiego, z których zwierzęta łatwo wyjdą.
OŚWIETLENIE I UVB	Światło służy przede wszystkim roślinom. Świetlówki lub listwy LED przez około 12 godzin dziennie wystarczą, a długość dnia może nieco zmieniać się w ciągu roku. Żaby można utrzymywać bez UV bez widocznej różnicy w kondycji, ale dla pewności można zapewnić słabe promieniowanie UV.
ŻYWIENIE	*Phyllobates terribilis* przyjmuje większe ofiary niż większość drzewołazów. W naturze podstawą pożywienia są mrówki, ale zjada wiele rodzajów drobnych stawonogów.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Phyllobates terribilis* jest aktywny w dzień, śmiały i ciekawski, widoczny przez większą część dnia z krótką przerwą w południe. Samce nawołują miękkim, ptasim trylem, zwłaszcza po zraszaniu.
NATURALNY ZASIĘG	Kolumbia.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/drzolazy/phyllobates-terribilis