herpy

DRZEWOŁAZY

## Golfodulcean Poison Frog

# *Phyllobates vittatus*

*Phyllobates vittatus* to czarny drzewołaz z dwoma wyraźnymi pomarańczowymi lub żółtymi paskami biegnącymi wzdłuż grzbietu i niebiesko marmurkowymi kończynami. Żyje wyłącznie w nizinnym lesie wokół Golfo Dulce w południowo-zachodniej Kostaryce. W terrarium jest aktywny w dzień, chętnie się odzywa i rozmnaża się bez większych problemów, a samiec sam przenosi kijanki do wody.

Rodzina: Dendrobatidae

### NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

#### ZWIERZĘ

| | |
|---|---|
| Wielkość dorosłego osobnika | **3-4 cm**<br>długość od pyska do kloaki |
| Długość życia | **10-20 lat** |
| Aktywność | **Za dnia** |
| Tryb życia | **Naziemny** |
| Środowisko | **Las deszczowy** |
| Toksyny skórne na wolności | **Słabe** |
| Toksyny skórne w niewoli | **Brak**<br>Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny |
| Trudność | **Średnio zaawansowany** |

#### HODOWLA

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **60 × 45 × 45 cm**<br>D × S × W dla 4 dorosłych osobników |
| Temperatura w dzień | **21-25 °C** |
| Temperatura w nocy | **18-21 °C** |
| Wilgotność | **70-100%** |
| Woda | **Miska z wodą**<br>głębokość 1-2 cm |
| UVB | **Opcjonalne**<br>Strefa Fergusona 1 |
| Pokarm | **Owady i małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)** |
| Utrzymanie | **W parach lub w grupach** |

#### ROZMNAŻANIE

| | |
|---|---|
| Rozmnażanie | **Jajorodny** |
| Rozwój | **Kijanki noszone do wody** |
| Miejsce składania jaj | **Na ziemi** |
| Dojrzałość płciowa | **8-10 miesięcy** |
| Liczba jaj w zniesieniu | **7-21** |
| Okres larwalny | **45-80 dni**<br>od wyklucia do metamorfozy |
| Pokarm larw | **Gotowa karma** |
| Opieka nad potomstwem | **Pilnuje jaj i nosi kijanki** |

#### OCHRONA I FORMALNOŚCI

| | |
|---|---|
| CITES | **Załącznik II** |
| IUCN | **Narażony (VU)** |

## Hodowla w skrócie

| | |
|---|---|
| **TERRARIUM** | Do czterech osobników *Phyllobates vittatus* potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 60 × 45 × 45 cm. |
| **TEMPERATURA** | W dzień *Phyllobates vittatus* potrzebuje 21-25 °C, a w nocy 18-21 °C, co zapewnia większość mieszkań. |
| **WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE** | Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-100 %. Gatunek znosi spadki do 50 % przez krótki czas, jeśli ma dostęp do wody, ale niska wilgotność bez wody może szybko okazać się śmiertelna. |
| **WODA I JAKOŚĆ WODY** | Zapewnij płytką miskę z wodą lub niewielką część wodną z 1-2 cm wody oraz kamieniem albo kawałkiem kory, żeby zwierzęta mogły łatwo wyjść. Żaby nawilżają się w wodzie, a samiec może składać w niej kijanki. |
| **OŚWIETLENIE I UVB** | Światło jest przeznaczone dla roślin. Wystarczą listwy LED lub świetlówki na wyłączniku czasowym przez 10-12 godzin dziennie, a noc musi być ciemna. Zapewnij cień i nigdy nie stawiaj terrarium w bezpośrednim słońcu. |
| **ŻYWIENIE** | *Phyllobates vittatus* jest nietypowy, ponieważ dorosłe osobniki przyjmują większe ofiary niż większość drzewołazów. |
| **ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM** | *Phyllobates vittatus* jest aktywny w dzień, a samce mają głośny, tryskający trelem głos godowy. Gatunek można trzymać w parach lub grupach. |
| **NATURALNY ZASIĘG** | Kostaryka. |