herpy

DRZEWOŁAZY

Amazonian Poison Frog

Ranitomeya amazonica

Ranitomeya amazonica to maleńki, dzienny drzewołaz o długości 16-19 mm z Amazonii w okolicach Iquitos w Peru i Leticii w Kolumbii. Jest czarny z czerwonymi, pomarańczowymi lub żółtymi paskami i niebieskoszarym marmurkowaniem na kończynach, rozmnaża się w bromeliach i uchodzi za jeden z najłatwiejszych w utrzymaniu i rozmnażaniu małych Ranitomeya.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Dendrobates amazonicus*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**16-19 mm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**5-10 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny i naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** D × S × W dla 3 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**21-26 °C**
Temperatura w nocy	**18-21 °C**
Wilgotność	**70-100%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1-2 cm
UVB	**Opcjonalne**
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**W kątach liści (np. bromelii)**
Dojrzałość płciowa	**5-8 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**2-8**
Czas do wyklucia	**10-14 dni**
Okres larwalny	**60-80 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Gotowa karma i inne kijanki**
Opieka nad potomstwem	**Nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Para lub trio *Ranitomeya amazonica* potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 40 × 40 × 40 cm.
TEMPERATURA	Utrzymuj w terrarium 21-26 °C w dzień i 18-21 °C w nocy. Żaby są najaktywniejsze i najlepiej się rozmnażają w cieplejszym zakresie, przy 24-26 °C.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-100 %, najlepiej 80-100 %. Zraszaj codziennie, najlepiej rano i wieczorem, tak aby po zraszaniu wilgotność była bliska 100 %, a w środku dnia spadała do około 70-75 %.
WODA I JAKOŚĆ WODY	*Ranitomeya amazonica* słabo pływa, więc woda musi być płytka, a wyjście z niej łatwe.
OŚWIETLENIE I UVB	Żaby są aktywne w dzień i żyją w cieniu lasu. Oświetlenie służy przede wszystkim roślinom: zapewnij 12-14 godzin światła LED dla roślin dziennie.
ŻYWIENIE	*Ranitomeya amazonica* jest tak mała, że może zjadać tylko drobne owady karmowe. Młode i dorosłe przyjmują nielotne muszki owocowe (*Drosophila melanogaster*), a duże dorosłe osobniki także *D. hydei* i świeżo wyklute świerszcze.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Ranitomeya amazonica* jest aktywna w dzień, ale często płochliwa, a zwłaszcza młode osobniki dużo się ukrywają. W gęsto obsadzonym terrarium z dużą ilością suchych liści żaby częściej się pokazują.
NATURALNY ZASIĘG	Peru i Kolumbia.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/drzolazy/ranitomeya-amazonica