herpy

DRZEWOŁAZY

Blessed Poison Frog

Ranitomeya benedicta

Ranitomeya benedicta to mały, aktywny w dzień drzewołaz o długości 16-20 mm, pochodzący z nizinnych lasów północnego Peru. Jaskrawoczerwona głowa i czarne ciało z niebieskim siateczkowym wzorem czynią go jednym z najbarwniejszych przedstawicieli rodzaju. Do 2008 roku uważano go za podgatunek *Ranitomeya fantastica*. W naturze jest gatunkiem narażonym, ale osobniki z hodowli chętnie rozmnażają się w dobrze urządzonym terrarium.

Rodzina: Dendrobatidae

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**16-20 mm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**5-10 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny i naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**21-26 °C**
Temperatura w nocy	**18-22 °C**
Wilgotność	**70-100%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1-2 cm
UVB	**Opcjonalne**
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Liczba jaj w zniesieniu	**2-6**
Czas do wyklucia	**10-14 dni**
Okres larwalny	**60-114 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Pilnuje jaj i nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Narażony (VU)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Parę *R. benedicta* można trzymać w terrarium 40 × 40 × 40 cm. Dwie pary potrzebują terrarium poziomego o pojemności około 75 litrów, a większe jest zawsze lepsze, bo duże terrarium utrzymuje bardziej stabilny klimat.
TEMPERATURA	Utrzymuj w terrarium 21-26 °C w dzień i 18-22 °C w nocy. Gatunek czuje się najlepiej w okolicach 21-24 °C, a temperatura nie może przez dłuższy czas przekraczać 27 °C.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-100 %.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Wystarczy płytka miseczka z wodą lub bromelia z wodą w kątach liści. Żaby słabo pływają, więc woda nie może być głębsza, niż pozwala najmniejszej żabie siedzieć w niej z głową i przednią częścią ciała nad powierzchnią.
OŚWIETLENIE I UVB	*R. benedicta* jest aktywna w dzień, a światło służy przede wszystkim roślinom. Zapewnij 12-14 godzin światła dziennie ze świetlówek lub LED na timerze przez cały rok, a w nocy ciemność. Odpowiada to długości dnia w tropikach.
ŻYWIENIE	Podstawą diety są małe żywe stawonogi. Osobniki w każdym wieku jedzą nielotne muszki owocowe (*Drosophila melanogaster*), a dorosłe mogą też przyjmować większą *D. hydei*.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*R. benedicta* jest aktywna w dzień i może być nieco płochliwa, zwłaszcza za młodu, ale w gęsto obsadzonym terrarium z kryjówkami dorosłe osobniki są dobrze widoczne. Samiec siedzi na widoku i nawołuje.
NATURALNY ZASIĘG	Peru.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/drzolazy/ranitomeya-benedicta