herpy

DRZEWOŁAZY

Red-headed Poison Frog

Ranitomeya fantastica

Ranitomeya fantastica to dzienny drzewołaz o długości 20-25 mm z północnego Peru i jeden z największych przedstawicieli rodzaju. Jest niezwykle zmienny, a wiele form ma jaskrawopomarańczową, czerwoną lub żółtą głowę nad czarnym ciałem z jasnym rysunkiem. Żaby są błyskawicznie szybkie i często płochliwe, jaja trudno znaleźć, a gatunek najlepiej nadaje się dla hodowcy, który ma już doświadczenie z drzewołazami.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Dendrobates fantasticus*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**20-25 mm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**5-10 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny i naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** D × S × W dla 3 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**21-26 °C**
Temperatura w nocy	**18-22 °C**
Wilgotność	**70-100%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1-2 cm
UVB	**Opcjonalne**
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Liczba jaj w zniesieniu	**3-8**
Czas do wyklucia	**10-14 dni**
Okres larwalny	**60-80 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Pilnuje jaj i nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Narażony (VU)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Parę lub trio *R. fantastica* można trzymać w terrarium o wymiarach 40 × 40 × 40 cm. Większe jest lepsze. Wiele form jest nadrzewnych i wykorzystuje wysokość.
TEMPERATURA	Utrzymuj w terrarium 21-26 °C w dzień i 18-22 °C w nocy. Temperatura nie może przez dłuższy czas przekraczać 27 °C, a powyżej 29 °C może być śmiertelna. Ciepło jest groźniejsze niż chłód.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-100 %.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Wystarczy płytka miska z wodą lub bromelia z wodą w kątach liści. Żaby słabo pływają, więc woda nie może być głębsza, niż pozwala najmniejszej żabie siedzieć w niej z głową i przednią częścią ciała nad powierzchnią.
OŚWIETLENIE I UVB	*R. fantastica* jest aktywny w dzień, a oświetlenie służy przede wszystkim roślinom. Zapewnij 12-14 godzin światła na dobę i ciemność w nocy. Nie udokumentowano, by gatunek potrzebował UVB.
ŻYWIENIE	Podstawą diety są drobne stawonogi. Młode i dorosłe przyjmują nielotne muszki owocowe (*Drosophila melanogaster*), a duże dorosłe osobniki mogą jeść także większą *D. hydei*.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*R. fantastica* jest aktywny w dzień, błyskawicznie szybki i często płochliwy, ale wiele osobników staje się śmielszych w okresie rozrodu. Najwięcej widać je w gęsto obsadzonym terrarium z kryjówkami.
NATURALNY ZASIĘG	Peru.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/drzolazy/ranitomeya-fantastica