herpy

DRZEWOŁAZY

Tahuayo Poison Frog

Ranitomeya flavovittata

Ranitomeya flavovittata to jeden z najmniejszych gatunków w rodzaju: mierzy zaledwie 15-17 mm od pyska do kloaki. Jest jaskrawożółty z czarnym rysunkiem, ma brązowe kończyny i jasnoniebieski brzuch, a pochodzi z lasu deszczowego w okolicach Iquitos w północno-wschodnim Peru. Jest aktywny w dzień i nieco płochliwy, chętnie rozmnaża się w pojemnikach po kliszach i bromeliach i jest dobrym wyborem dla hodowcy z pewnym doświadczeniem.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Dendrobates flavovittatus*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**15-17 mm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**5-10 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny i naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**30 × 30 × 45 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**21-26 °C**
Temperatura w nocy	**18-21 °C**
Wilgotność	**70-100%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1-2 cm
UVB	**Opcjonalne**
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**W kątach liści (np. bromelii)**
Dojrzałość płciowa	**5-8 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**2-6**
Czas do wyklucia	**10-14 dni**
Okres larwalny	**60-80 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Gotowa karma i niezapłodnione jaja samicy**
Opieka nad potomstwem	**Nosi kijanki i karmi kijanki jajami**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Para *R. flavovittata* potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 30 × 30 × 45 cm, choć większe jest zawsze lepsze.
TEMPERATURA	Utrzymuj w terrarium 21-26 °C w dzień i 18-21 °C w nocy. Temperatura nocna została przyjęta na podstawie gatunków pokrewnych. Temperatura nie może przez dłuższy czas przekraczać 27 °C, a powyżej 29 °C może być śmiertelna.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-100 %. Gatunek może krótko znieść około 50 %, jeśli ma dostęp do czystej wody, ale to rozwiązanie awaryjne, a jeśli stan się utrzymuje, może być śmiertelny.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Zapewnij żabom płytką miskę z wodą lub niewielką część wodną i utrzymuj tak niski poziom wody, aby najmniejsza żaba mogła siedzieć z głową i przednią częścią ciała nad powierzchnią: gatunek słabo pływa.
OŚWIETLENIE I UVB	Żaby są aktywne w dzień i żyją w cieniu lasu deszczowego. Oświetlenie służy przede wszystkim roślinom: odpowiednie jest światło LED przez 12-14 godzin dziennie.
ŻYWIENIE	*R. flavovittata* jest tak mały, że może zjadać tylko drobne owady karmowe.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*R. flavovittata* jest aktywny w dzień, szybki i nieco płochliwy. Żaby stają się śmielsze, jeśli terrarium jest gęsto obsadzone roślinami i ma wiele kryjówek, a także przyzwyczajają się do ciebie, jeśli obserwujesz je przez szybę.
NATURALNY ZASIĘG	Peru.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/drzolazy/ranitomeya-flavovittata