herpy

DRZEWOŁAZY

Mimic Poison Frog

Ranitomeya imitator

Ranitomeya imitator to mały, aktywny w dzień drzewołaz o długości 16-20 mm z północnego Peru. Każda forma lokalna naśladuje innego trującego płaza z tego samego obszaru, a gatunek ten był pierwszym płazem, u którego wykazano prawdziwą monogamię: para wspólnie opiekuje się potomstwem, a samica karmi każdą kijankę niezapłodnionymi jajami.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Dendrobates imitator; Ranitomeya intermedia*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**16-20 mm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**5-10 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny i naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy i las górski**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**21-26 °C**
Temperatura w nocy	**18-22 °C**
Wilgotność	**70-100%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1-2 cm
UVB	**Opcjonalne**
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Dojrzałość płciowa	**5-8 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**1-8**
Czas do wyklucia	**7-16 dni**
Okres larwalny	**60-80 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Gotowa karma i niezapłodnione jaja samicy**
Opieka nad potomstwem	**Pilnuje jaj, nosi kijanki i karmi kijanki jajami**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Para *R. imitator* potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 45 × 45 × 45 cm. Żaby chętnie się wspinają, więc wykorzystują wysokość.
TEMPERATURA	Utrzymuj w terrarium 21-26 °C w dzień i 18-22 °C w nocy. Gatunek czuje się najlepiej w około 21-24 °C.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-100 %. Celuj w prawie 100 % rano i wieczorem oraz 70-75 % w środku dnia, aby terrarium mogło trochę przeschnąć między zraszaniami.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Wystarczy płytka miska z wodą lub bromelia z wodą w kątach liści. Woda nie może być głębsza, niż pozwala na to, by najmniejsza żaba mogła w niej siedzieć z głową i górną częścią ciała nad powierzchnią, bo gatunek słabo pływa.
OŚWIETLENIE I UVB	*R. imitator* jest aktywna w dzień i żyje w cieniu pod koronami drzew. Oświetlenie służy przede wszystkim roślinom. Zapewnij oświetlenie LED przez 12-14 godzin dziennie, np. od 8 do 20.
ŻYWIENIE	Podstawą diety są drobne stawonogi: nielotne muszki owocowe (*Drosophila melanogaster*), skoczogonki i małe równonogi. Duże dorosłe osobniki mogą też jeść większą *D. hydei*.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*R. imitator* jest śmiała i aktywna w dzień i często widać ją na widoku w terrarium. Samiec nawołuje ze stałych miejsc, a obie płcie bronią terytorium pary przed osobnikami tego samego gatunku.
NATURALNY ZASIĘG	Peru.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/drzolazy/ranitomeya-imitator