herpy

DRZEWOŁAZY

Red-backed Poison Frog

Ranitomeya reticulata

Ranitomeya reticulata to jeden z najmniejszych drzewołazów: ma zaledwie 13-17 mm, miedzianoczerwony do pomarańczowego grzbiet i niebieskoszare kończyny z czarnym siateczkowatym wzorem. Zamieszkuje nizinny las amazoński w północno-wschodnim Peru i wschodnim Ekwadorze. W terrarium jest śmiały i żywy, ale wymagający, bo jaja trudno znaleźć, a młode trudno odchować.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Dendrobates reticulatus*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**13-17 mm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**5-10 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny i naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**30 × 30 × 45 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**22-26 °C**
Temperatura w nocy	**18-22 °C**
Wilgotność	**70-100%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1-2 cm
UVB	**Opcjonalne**
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Liczba jaj w zniesieniu	**1-8**
Czas do wyklucia	**10-14 dni**
Okres larwalny	**60-80 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Para *R. reticulata* potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 30 × 30 × 45 cm, najlepiej 40 × 40 × 45 cm lub większego. Żaby chętnie się wspinają, więc wykorzystują wysokość.
TEMPERATURA	Utrzymuj w terrarium 22-26 °C w dzień i 18-22 °C w nocy. Temperatura nie może przez dłuższy czas przekraczać 27 °C, a powyżej 29 °C może być śmiertelna. Ciepło jest zawsze groźniejsze niż chłód.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-100 %. Dobry rytm to prawie 100 % rano i wieczorem oraz 70-75 % w środku dnia, tak aby terrarium trochę przeschło między zraszaniami.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Wystarczy płytka miseczka z wodą albo bromelia z wodą w kątach liści.
OŚWIETLENIE I UVB	*R. reticulata* jest aktywny w dzień, a oświetlenie służy przede wszystkim roślinom. Zapewnij 12-14 godzin światła dziennie, np. LED od 8 do 20, i ciemność w nocy. Nie udokumentowano, by gatunek potrzebował UVB.
ŻYWIENIE	Podstawą diety są drobne stawonogi. Młode i większość dorosłych przyjmuje nielotne muszki owocówki (*Drosophila melanogaster*), a duże dorosłe osobniki mogą jeść także większą *D. hydei*.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*R. reticulata* jest błyskawicznie szybki i śmiały, często widać go na otwartej przestrzeni, jakby nie zdawał sobie sprawy, jak jest mały. Samce nawołują ze stałych miejsc wysokim, krótkim brzęczeniem.
NATURALNY ZASIĘG	Peru i Ekwador.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/drzolazy/ranitomeya-reticulata