herpy

DRZEWOŁAZY

Sira Poison Frog

Ranitomeya sirensis

Ranitomeya sirensis to mały, aktywny za dnia drzewołaz o długości 15-25 mm, pochodzący ze wschodniego Peru, północnej Boliwii i najdalej na zachód wysuniętej części Brazylii. Gatunek obejmuje formy sprzedawane dawniej jako "lamasi" i "biolat", a większość z nich należy do drzewołazów, które najłatwiej rozmnożyć. Żaby dobrze czują się w grupach, o ile mają wystarczająco dużo miejsca.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Ranitomeya lamasi; Dendrobates lamasi; Dendrobates sirensis*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**15-25 mm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**5-10 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny i naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy i las górski**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** D × S × W dla 3 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**21-25 °C**
Temperatura w nocy	**18-21 °C**
Wilgotność	**80-100%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1-2 cm
UVB	**Opcjonalne**
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**W kątach liści (np. bromelii)**
Dojrzałość płciowa	**5-8 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**1-8**
Czas do wyklucia	**10-14 dni**
Okres larwalny	**58-80 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Pilnuje jaj i nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Para lub trio *R. sirensis* potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 45 × 45 × 45 cm. Gatunek korzysta na nieco większej powierzchni dna i gęstej roślinności, a duża forma górska najlepiej czuje się w większym terrarium.
TEMPERATURA	Utrzymuj w terrarium 21-25 °C w dzień i 18-21 °C w nocy. Temperatura nie może przez dłuższy czas przekraczać 27 °C, a powyżej 29 °C jest niebezpieczna.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 80-100 %. Gatunek znosi spadek do 50 % tylko krótko i tylko wtedy, gdy ma dostęp do wody; niska wilgotność bez wody może szybko okazać się śmiertelna.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Wystarczy płytka miska z wodą lub bromelia z wodą w kątach liści. Utrzymuj wodę na głębokości 1-2 cm, tak aby najmniejsza żaba mogła w niej siedzieć z głową i przednią częścią ciała nad wodą.
OŚWIETLENIE I UVB	*R. sirensis* jest aktywna za dnia, a światło służy przede wszystkim roślinom. Zapewnij 12-14 godzin światła dziennie z świetlówek lub LED i ciemność w nocy. Nie udokumentowano, by gatunek potrzebował UVB.
ŻYWIENIE	Podstawą diety są małe stawonogi: nielotne muszki owocowe (*Drosophila melanogaster*), skoczogonki i małe równonogi. Dorosłe przyjmują też większą *D. hydei* i świeżo wyklute świerszcze.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*R. sirensis* jest często płochliwa i chętnie się ukrywa, dlatego gęsto obsadzone terrarium z wieloma kryjówkami daje najwięcej do oglądania. Samiec nawołuje, aby zwabić samicę do miejsca składania jaj.
NATURALNY ZASIĘG	Boliwia, Brazylia i Peru.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/drzolazy/ranitomeya-sirensis