herpy

DRZEWOŁAZY

Summers' Poison Dart Frog

Ranitomeya summersi

Ranitomeya summersi to niewielki, dzienny drzewołaz o długości 16-21 mm z doliny Huallaga w Peru, pomarańczowy lub miedziany z czarnym marmurkowaniem i czarną maską na oczach. Gatunek jest zagrożony w naturze, jaja trudno odnaleźć, a żaby są szybkie i płochliwe, dlatego najlepiej nadaje się dla hodowcy z doświadczeniem w utrzymywaniu drzewołazów.

Rodzina: Dendrobatidae

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**16-21 mm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**5-10 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny i naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**30 × 30 × 45 cm** D × S × W dla 3 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**21-26 °C**
Temperatura w nocy	**18-21 °C**
Wilgotność	**70-100%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1-2 cm
UVB	**Opcjonalne**
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Liczba jaj w zniesieniu	**4-9**
Czas do wyklucia	**10-14 dni**
Okres larwalny	**60-80 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Pilnuje jaj i nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Zagrożony (EN)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Parę lub małe trio *R. summersi* można trzymać w terrarium o wymiarach co najmniej 30 × 30 × 45 cm (długość × szerokość × wysokość), a większe jest lepsze.
TEMPERATURA	Utrzymuj w terrarium 21-26 °C w dzień i 18-21 °C w nocy. Temperatura nie może przez dłuższy czas przekraczać 27 °C, a powyżej 29 °C jest śmiertelnie niebezpieczna. Gatunek gorzej znosi ciepło niż chłód.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-100 %.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Wystarczy płytka miska z wodą lub bromelia z wodą w kątach liści. Żaby słabo pływają, więc woda nie może być głębsza niż taka, w której najmniejsza żaba może siedzieć z głową i przednią częścią ciała nad wodą.
OŚWIETLENIE I UVB	*R. summersi* jest aktywna w dzień, a światło służy przede wszystkim roślinom. Zapewnij 12-14 godzin światła w ciągu dnia i ciemność w nocy. Nie udokumentowano, aby gatunek potrzebował UVB.
ŻYWIENIE	Podstawą diety są drobne żywe stawonogi. Młode i młodociane osobniki zjadają nielotne muszki owocowe (*Drosophila melanogaster*), a duże dorosłe mogą też przyjmować większą *D. hydei*.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*R. summersi* jest aktywna w dzień, szybka i często płochliwa, ale może stać się śmielsza, gdy przyzwyczai się do terrarium. Najczęściej widać je w gęsto obsadzonym terrarium z kryjówkami.
NATURALNY ZASIĘG	Peru.