herpy

DRZEWOŁAZY

Red Uakari Poison Frog

Ranitomeya uakarii

Ranitomeya uakarii to bardzo mały, aktywny w dzień drzewołaz o długości 13-16 mm z dorzecza Amazonki. Jest czarny z czerwonymi do pomarańczowych paskami, żółtymi bokami i niebieskimi nogami, a w hodowli spotyka się go rzadko. Zalecenia opierają się na doświadczeniach z całym rodzajem, a gatunek nadaje się dla doświadczonego hodowcy, który ma cierpliwość i stałe źródło maleńkiego pokarmu.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Dendrobates uakarii*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**13-16 mm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**5-6 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny i naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** D × S × W dla 3 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**21-25 °C**
Temperatura w nocy	**18-21 °C**
Wilgotność	**70-100%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1-2 cm
UVB	**Opcjonalne**
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**W kątach liści (np. bromelii)**
Liczba jaj w zniesieniu	**2-7**
Czas do wyklucia	**10-14 dni**
Okres larwalny	**60-100 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Para lub trio *Ranitomeya uakarii* potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 45 × 45 × 45 cm. Wymiary są zapożyczone z doświadczeń z rodzajem.
TEMPERATURA	Utrzymuj w terrarium 21-25 °C w dzień i 18-21 °C w nocy. Wartości są zapożyczone z doświadczeń z rodzajem. Dodatkowe ogrzewanie rzadko jest potrzebne w ogrzewanym pokoju.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-100 %. Zraszaj codziennie, tak aby rano i wieczorem wilgotność była bliska 100 %, a w środku dnia wynosiła 70-75 %. Między zraszaniami terrarium może nieco przeschnąć.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Wystarczy płaska miseczka z wodą lub bromelia z wodą w kątach liści.
OŚWIETLENIE I UVB	*Ranitomeya uakarii* jest aktywny w dzień, a oświetlenie służy przede wszystkim roślinom. Zapewnij 12-14 godzin światła dziennie ze świetlówek lub LED i ciemność w nocy. Nie udokumentowano, by gatunek potrzebował UVB.
ŻYWIENIE	Podstawą diety są drobne stawonogi: nielotne muszki owocowe, skoczogonki, małe białe równonogi i świeżo wyklute świerszcze.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Ranitomeya uakarii* jest aktywny w dzień. W gęsto obsadzonym terrarium z wieloma kryjówkami zwykle widać żaby częściej niż w pustym terrarium, ale te małe żaby bywają płochliwe i chowają się, gdy podchodzisz do szyby.
NATURALNY ZASIĘG	Brazylia, Kolumbia i Peru.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/drzolazy/ranitomeya-uakarii