herpy

DRZEWOŁAZY

## Brazilian Poison Frog

# *Ranitomeya vanzolinii*

*Ranitomeya vanzolinii* to mały, aktywny w dzień drzewołaz o długości 17-19 mm z zachodniej Amazonii. Żyje na drzewach, a potomstwo wychowuje w wodzie gromadzącej się w bromeliach. Samica karmi kijanki niezapłodnionymi jajami.

Rodzina: Dendrobatidae  Dawna nazwa: *Dendrobates vanzolinii*

### NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

#### ZWIERZĘ

| | |
|---|---|
| Wielkość dorosłego osobnika | **17-19 mm**<br>długość od pyska do kloaki |
| Długość życia | **5-6 lat** |
| Aktywność | **Za dnia** |
| Tryb życia | **Nadrzewny** |
| Środowisko | **Las deszczowy i las górski** |
| Toksyny skórne na wolności | **Słabe** |
| Toksyny skórne w niewoli | **Brak**<br>Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny |
| Trudność | **Średnio zaawansowany** |

#### HODOWLA

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **40 × 40 × 40 cm**<br>D × S × W dla 2 dorosłych osobników |
| Temperatura w dzień | **23-26 °C** |
| Temperatura w nocy | **19-23 °C** |
| Wilgotność | **70-100%** |
| Woda | **Miska z wodą**<br>głębokość 1-2 cm |
| UVB | **Opcjonalne** |
| Pokarm | **Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)** |
| Utrzymanie | **W parach lub w grupach** |

#### ROZMNAŻANIE

| | |
|---|---|
| Rozmnażanie | **Jajorodny** |
| Rozwój | **Kijanki noszone do wody** |
| Miejsce składania jaj | **W kątach liści (np. bromelii)** |
| Liczba jaj w zniesieniu | **1-6** |
| Czas do wyklucia | **10-14 dni** |
| Okres larwalny | **60-80 dni**<br>od wyklucia do metamorfozy |
| Pokarm larw | **Gotowa karma i niezapłodnione jaja samicy** |
| Opieka nad potomstwem | **Nosi kijanki i karmi kijanki jajami** |

#### OCHRONA I FORMALNOŚCI

| | |
|---|---|
| CITES | **Załącznik II** |
| IUCN | **Najmniejszej troski (LC)** |

## Hodowla w skrócie

**TERRARIUM**

Para *Ranitomeya vanzolinii* potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 40 × 40 × 40 cm, najlepiej 50 × 50 × 50 cm. Żaba jest nadrzewna i wykorzystuje wysokość, więc wysokie terrarium z wieloma pionowymi powierzchniami jest lepsze niż niskie i szerokie.

**TEMPERATURA**

Temperatura w dzień powinna wynosić 23-26 °C, a w nocy obniża się ją o 3-4 °C do 19-23 °C. Wahania w ciągu roku powinny być niewielkie, 1-2 °C. Miejsce wygrzewania nie jest potrzebne, a gatunek nie ma spoczynku zimowego.

**WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE**

Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-100 %. Rano i wieczorem powinna być bliska 100 %, a w południe może spaść do 70-75 %. Terrarium zraszaj codziennie, najlepiej rano i wieczorem, wodą z odwróconej osmozy lub deszczówką.

**WODA I JAKOŚĆ WODY**

Miska z wodą nie jest konieczna dla dorosłych osobników, ale jest korzystna i może być płytka, z 1-2 cm wody.

**OŚWIETLENIE I UVB**

Zapotrzebowanie *Ranitomeya vanzolinii* na światło jest niewielkie. Żaba potrzebuje tyle światła, by widzieć pokarm, a rośliny potrzebują więcej.

**ŻYWIENIE**

*Ranitomeya vanzolinii* żywi się małymi, żywymi stawonogami: muszkami owocowymi, skoczogonkami, małymi tropikalnymi równonogami i świeżo wyklutymi świerszczami. Małe zwierzęta wymagają małego pokarmu.

**ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM**

*Ranitomeya vanzolinii* jest aktywna w dzień, ale płochliwa. W gęsto obsadzonym terrarium z wieloma kryjówkami pokazuje się częściej niż w skąpo urządzonym. Żaba wydaje tryl, który słychać głównie rano i wieczorem.

**NATURALNY ZASIĘG**

Brazylia i Peru.