herpy

DRZEWOŁAZY

Variable Poison Frog

Ranitomeya variabilis

Ranitomeya variabilis to mały, aktywny w dzień drzewołaz o długości 15-20 mm, pochodzący ze wschodnich stoków Andów i z Amazonii. Występuje w wielu lokalnych formach w kolorze żółtym, zielonym i niebieskim z czarnym rysunkiem, rozmnaża się w bromeliach i słynie z tego, że samiec przenosi kijanki między zbiornikami wody w roślinach. Dobry pierwszy gatunek wśród małych drzewołazów.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Dendrobates variabilis*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**15-20 mm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**5-10 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny i naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy i las górski**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**21-26 °C**
Temperatura w nocy	**18-22 °C**
Wilgotność	**70-100%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1-2 cm
UVB	**Opcjonalne**
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**W kątach liści (np. bromelii)**
Liczba jaj w zniesieniu	**1-10**
Czas do wyklucia	**10-14 dni**
Okres larwalny	**60-80 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Gotowa karma i inne kijanki**
Opieka nad potomstwem	**Nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Para *R. variabilis* potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 40 × 40 × 40 cm, a te same wymiary wystarczą dla trio.
TEMPERATURA	Utrzymuj w terrarium 21-26 °C w dzień i 18-22 °C w nocy. Krótkotrwale gatunek znosi do 27 °C, ale temperatura nigdy nie może przekroczyć 29 °C. Jaja i kijanki można trzymać w stałej temperaturze 24 °C.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-100 %. Dąż do niemal 100 % rano i wieczorem oraz 70-75 % w środku dnia. Gatunek może krótko wytrzymać przy 50 %, jeśli ma czystą wodę, w której może siedzieć, ale to rozwiązanie awaryjne.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Daj żabom płytką miskę z wodą lub małą część wodną i utrzymuj tak niski poziom wody, aby najmniejsza żaba mogła siedzieć z głową i przednią częścią ciała nad wodą; gatunek słabo pływa.
OŚWIETLENIE I UVB	Żaby są aktywne w dzień i żyją w cieniu lasu. Światło służy przede wszystkim roślinom: odpowiednie jest oświetlenie LED przez 12-14 godzin dziennie. Nie udokumentowano, by gatunek potrzebował UVB, i zwykle się go nie stosuje.
ŻYWIENIE	*R. variabilis* jest tak mała, że może zjadać tylko drobne owady karmowe: skoczogonki, nielotne muszki owocowe (*Drosophila melanogaster*) i małe równonogi. Duże dorosłe osobniki mogą też przyjmować *D. hydei*.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*R. variabilis* jest aktywna w dzień i spokojna. Samce nawołują z podwyższonych miejsc, a w naturze gatunek ma swobodny system kojarzenia się, bez stałych par i bez bronionych terytoriów.
NATURALNY ZASIĘG	Peru, Ekwador, Kolumbia, Brazylia i Gujana Francuska.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/drzolazy/ranitomeya-variabilis