herpy

DRZEWOŁAZY

Amazonian Poison Frog

Ranitomeya ventrimaculata

Ranitomeya ventrimaculata to mały, aktywny w dzień drzewołaz o długości poniżej 18 mm, pochodzący z lasów deszczowych wschodniego Ekwadoru, północno-wschodniego Peru i południowo-wschodniej Kolumbii. W ścisłym znaczeniu jest czarny z cienkimi różowymi paskami i niebieskoszarym siateczkowatym wzorem na nogach i brzuchu. Przez dziesięciolecia nazwa ta obejmowała w hobby inne gatunki, dlatego ważne jest, by wiedzieć, jakie zwierzęta się faktycznie posiada.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Dendrobates ventrimaculatus; Dendrobates minutus ventrimaculatus; Dendrobates duellmani; Ranitomeya duellmani*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**15-17 mm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**5-10 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny i naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**21-26 °C**
Temperatura w nocy	**18-22 °C**
Wilgotność	**70-100%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1-2 cm
UVB	**Opcjonalne**
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Liczba jaj w zniesieniu	**1-4**
Okres larwalny	**60-80 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Gotowa karma i inne kijanki**
Opieka nad potomstwem	**Nosi kijanki**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Gatunek w ścisłym znaczeniu jest w terrariach niemal nieznany i nie ma doświadczeń hodowlanych dotyczących właśnie jego. Podane tu wartości są takie same jak dla innych małych Ranitomeya.
TEMPERATURA	Utrzymuj w terrarium 21-26 °C w dzień i 18-22 °C w nocy. Temperatura nigdy nie może przekroczyć 29 °C, a małe terraria latem szybko się przegrzewają.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-100 %: blisko 100 % rano i wieczorem oraz 70-75 % w środku dnia.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Zapewnij żabom płaską miskę z wodą lub małą część wodną z 1-2 cm wody, tak by najmniejsza żaba mogła siedzieć z głową i przednią częścią ciała nad wodą; małe drzewołazy słabo pływają.
OŚWIETLENIE I UVB	Żaby są aktywne w dzień i żyją w cieniu lasu. Światło służy przede wszystkim roślinom: typowe jest 12-14 godzin dziennie z oświetleniem LED.
ŻYWIENIE	*Ranitomeya ventrimaculata* jest tak mała, że może przyjmować tylko drobne owady karmowe: skoczogonki, nielotne muszki owocowe (*Drosophila melanogaster*), małe tropikalne prosionki i świeżo wyklute świerszcze.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Ranitomeya ventrimaculata* jest aktywna w dzień i żyje głównie w ściółce na dnie lasu. Samce nawołują szybkim brzęczeniem. Małe Ranitomeya są często płochliwe, ale w gęsto obsadzonym terrarium zwykle widać je częściej.
NATURALNY ZASIĘG	Ekwador, Peru i Kolumbia.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/drzolazy/ranitomeya-ventrimaculata