herpy

GEKONY

Belep giant gecko

Correlophus belepensis

Correlophus belepensis to duży, rzadki gekon, który żyje wyłącznie na jednej małej wyspie w archipelagu Belep, na północny zachód od Grande Terre w Nowej Kaledonii. Przypomina blisko spokrewnionego *Correlophus ciliatus* i ma wyraźny grzebień kolców biegnący od oka w stronę barku. Gatunek jest krytycznie zagrożony w naturze, a wiedza o jego utrzymaniu w niewoli jest niemal żadna.

Rodzina: Diplodactylidae

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**18-22 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**15-20 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Nadrzewny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 45 × 90 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**22-26 °C**
Miejsce wygrzewania	**26-28 °C**
Temperatura w nocy	**18-21 °C**
Wilgotność	**50-80%**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Owady, owoce i gotowa karma**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**1-2 jaj**
Inkubacja	**60-120 dni** przy 22-26 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Krytycznie zagrożony (CR)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o utrzymaniu *Correlophus belepensis* jest niemal żadna.
TEMPERATURA	W dzień odpowiednia dla *Correlophus belepensis* jest temperatura 22-26 °C, a niewielki obszar na górze może osiągać 26-28 °C. W nocy temperatura może spaść do 18-21 °C. Przegrzanie jest większym zagrożeniem niż chłód.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza w terrarium *Correlophus belepensis* powinna się wahać: wilgotne noce i suchsze dni. Wieczorem dokładnie zraszaj terrarium, aby wilgotność wzrosła do 70-80 %, a w ciągu dnia pozwól jej spaść do 50-60 %.
OŚWIETLENIE I UVB	*Correlophus belepensis* jest aktywny o zmierzchu i w nocy, a w dzień śpi w ukryciu.
ŻYWIENIE	*Correlophus belepensis* karmi się tak jak blisko spokrewnionego *Correlophus ciliatus*, który odżywia się owocami i owadami.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Jak inne gekony aktywne o zmierzchu, *Correlophus belepensis* prawdopodobnie źle znosi częste branie na ręce. Daj nowym zwierzętom kilka tygodni na aklimatyzację i nie bierz ich do ręki, dopóki nie zaczną regularnie jeść.
NATURALNY ZASIĘG	Nowa Kaledonia.