herpy

GEKONY

Bauer's chameleon gecko

Eurydactylodes agricolae

Eurydactylodes agricolae to mały, smukły wspinacz z lasów północno-zachodniej Nowej Kaledonii, o oliwkowo- lub mszystozielonej, ziarnistej łuskowatej skórze i żółtych znaczeniach przy pysku i na kończynach. Źle znosi upał, ale nie jest trudny w utrzymaniu w chłodnym, wilgotnym i gęsto obsadzonym roślinami terrarium.

Rodzina: Diplodactylidae

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**5-6 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**10-15 lat**
Aktywność	**Za dnia i o zmierzchu**
Tryb życia	**Nadrzewny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**30 × 30 × 45 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**18-24 °C**
Temperatura w nocy	**16-20 °C**
Wilgotność	**60-90%**
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Owady i gotowa karma**
Utrzymanie	**Pojedynczo, w parach lub jeden samiec z kilkoma samicami**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**18-36 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**1-2 jaj**
Zniesienia w roku	**5-7**
Inkubacja	**60-120 dni** przy 22-25 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Bliski zagrożenia (NT)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM

Jednego dorosłego osobnika *Eurydactylodes agricolae* lub parę można trzymać w terrarium o wymiarach co najmniej 30 × 30 × 45 cm (długość × szerokość × wysokość), a wyższe jest zawsze lepsze.

TEMPERATURA

Eurydactylodes agricolae pochodzi z lasów o umiarkowanej temperaturze i źle znosi upał. Utrzymuj w dzień 18-24 °C; zwierzęta dobrze radzą sobie w zwykłej temperaturze pokojowej. W nocy temperatura może spaść do 16-20 °C.

WILGOTNOŚĆ I WODA

Wilgotność powietrza u *Eurydactylodes agricolae* powinna być umiarkowana do wysokiej i zmieniać się w ciągu doby. Celuj w 60-70 % w ciągu dnia i 80-90 % po wieczornym zraszaniu.

OŚWIETLENIE I UVB

Eurydactylodes agricolae jest aktywny w dzień i o zmierzchu i chętnie wygrzewa się pod światłem UVB. Zapewnij stały rytm dobowy z 10-14 godzinami światła. UVB nie jest bezwzględnie konieczne.

ŻYWIENIE

Podstawą żywienia *Eurydactylodes agricolae* jest gotowa sproszkowana karma dla owocożernych gekonów nowokaledońskich, którą rozrabia się na gładką papkę.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

Eurydactylodes agricolae jest mały, szybki i delikatny i przede wszystkim jest zwierzęciem do obserwowania. Przy odrobinie cierpliwości może przyzwyczaić się do krótkiego, spokojnego brania na rękę.

NATURALNY ZASIĘG

Nowa Kaledonia.