herpy

GEKONY

Western chameleon gecko

Eurydactylodes occidentalis

Eurydactylodes occidentalis to najmniejszy gatunek w rodzaju nowokaledońskich gekonów kameleonowych: mały, nocny gekon nadrzewny z chwytnym ogonem, występujący wyłącznie na nizinach przybrzeżnych po zachodniej stronie Grande Terre. Gatunek opisano dopiero w 2009 roku, w naturze jest zagrożony, a w niewoli spotyka się go rzadko. Zalecenia dotyczące hodowli opierają się na spokrewnionych gatunkach *Eurydactylodes vieillardi* i *Eurydactylodes agricolae*.

Rodzina: Diplodactylidae

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**5 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**10-15 lat**
Aktywność	**W nocy**
Tryb życia	**Nadrzewny**
Środowisko	**Suchy las**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**22-26 °C**
Miejsce wygrzewania	**27-29 °C**
Temperatura w nocy	**20-23 °C**
Wilgotność	**60-80%**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Owady, owoce i gotowa karma**
Utrzymanie	**Pojedynczo, w parach lub jeden samiec z kilkoma samicami**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**1-2 jaj**
Inkubacja	**50-90 dni** przy 22-26 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Zagrożony (EN)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM

Wiedza o hodowli *Eurydactylodes occidentalis* jest skąpa. Podane wartości zaczerpnięto od *Eurydactylodes vieillardi* i *Eurydactylodes agricolae*, które mają niemal taki sam tryb życia i rozmiary.

TEMPERATURA

W dzień w większej części terrarium powinno być 22-26 °C, a w miejscu wygrzewania pod lampą 27-29 °C. W nocy temperatura powinna spaść do 20-23 °C.

WILGOTNOŚĆ I WODA

Utrzymuj wilgotność powietrza na poziomie 60-80 %, mierzoną w środku terrarium. Najniższa jest w ciepłej części, najwyższa w chłodnej. W nocy powinna rosnąć, a w ciągu dnia spadać, ale nigdy poniżej 50 %.

OŚWIETLENIE I UVB

Gatunek jest nocny i może obejść się bez UVB, jeśli pokarm zawiera witaminę D3, ale słabe światło UVB jest korzystne.

ŻYWIENIE

Gatunek jest prawdopodobnie owocożerny i owadożerny, podobnie jak reszta rodzaju. Podawaj mniej więcej w połowie gotową karmę dla gekonów owocożernych, rozrobioną na gęstą papkę, a w połowie żywe owady.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

Eurydactylodes occidentalis jest mały i spokojny, a gatunki z tego rodzaju można przyzwyczaić do krótkiego brania na ręce. Daj nowemu zwierzęciu dwa tygodnie spokoju i bierz je na ręce tylko wtedy, gdy je.

NATURALNY ZASIĘG

Nowa Kaledonia.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/gekony/eurydactylodes-occidentalis