herpy

GEKONY

Symmetrical gecko

Eurydactylodes symmetricus

Eurydactylodes symmetricus to mały, nocny i rzadki gekon z zarośli i lasów południowej Nowej Kaledonii, o dużych, symetrycznie ułożonych łuskach na głowie i chwytnym ogonie. Jest znacznie mniej znany niż pokrewne *Eurydactylodes agricolae* i *Eurydactylodes vieillardi*, ale hodowla jest prawdopodobnie niemal taka sama.

Rodzina: Diplodactylidae Dawna nazwa: *Eurydactylus symmetricus*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**10-13 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**10-15 lat**
Aktywność	**W nocy**
Tryb życia	**Nadrzewny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**22-26 °C**
Miejsce wygrzewania	**27-29 °C**
Temperatura w nocy	**20-23 °C**
Wilgotność	**60-80%**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Owady, owoce i gotowa karma**
Utrzymanie	**Pojedynczo, w parach lub jeden samiec z kilkoma samicami**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**1-2 jaj**
Inkubacja	**50-90 dni** przy 22-26 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Bliski zagrożenia (NT)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o hodowli *Eurydactylodes symmetricus* jest skąpa. Podane tu wartości zapożyczono od *Eurydactylodes vieillardi* i *Eurydactylodes agricolae*, które mają tę samą wielkość i tryb życia.
TEMPERATURA	Zapewnij miejsce do wygrzewania pod lampą o temperaturze 27-29 °C i chłodną strefę 21-24 °C. W ciągu dnia w większości terrarium panuje 22-26 °C, a w nocy temperatura spada do 20-23 °C.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Utrzymuj wilgotność powietrza na poziomie 60-80 %, mierzoną na środku terrarium. Powinna rosnąć w nocy i spadać w ciągu dnia, ale nigdy nie schodzić poniżej 50 %.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek jest nocny i może obejść się bez UVB, jeśli pokarm zawiera witaminę D3, ale słabe światło UVB jest korzystne. Świetlówkę UVB dla gatunków cieniolubnych (strefa Fergusona 1), np. świetlówkę T5 7 %, umieść 20-30 cm nad siatką lub 25-40 cm pod siatką.
ŻYWIENIE	Gatunek jest prawdopodobnie owocożerno-owadożerny, jak pozostałe gatunki rodzaju.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Gatunki z tego rodzaju są małe, stosunkowo spokojne i można je przyzwyczaić do brania na rękę. Nowemu zwierzęciu daj dwa tygodnie spokoju i bierz je na rękę tylko wtedy, gdy już je.
NATURALNY ZASIĘG	Nowa Kaledonia.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/gekony/eurydactylodes-symmetricus