herpy

GEKONY

## Gekon domowy

# *Hemidactylus frenatus*

*Hemidactylus frenatus* to odporny, nocny gekon z Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, który wraz ze statkami i ładunkami rozprzestrzenił się w całych tropikach i dziś zamieszkuje domy w dużej części świata. Wspina się po pionowych powierzchniach, poluje na owady pod lampami i odzywa się głośnym, tykającym cmokaniem. W terrariach jest rzadki i najbardziej znany jest jako gatunek inwazyjny.

Rodzina: Gekkonidae  Nazwa angielska: Common house gecko  Dawna nazwa: *Hemidactylus vittatus; Hemidactylus okinawensis*

### NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

#### ZWIERZĘ

| | |
|---|---|
| Wielkość dorosłego osobnika | **8-15 cm**<br>długość całkowita z ogonem |
| Długość życia | **5-8 lat** |
| Aktywność | **O zmierzchu i w nocy** |
| Tryb życia | **Nadrzewny i skalny** |
| Środowisko | **Las deszczowy** |
| Trudność | **Średnio zaawansowany** |

#### HODOWLA

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **40 × 30 × 40 cm**<br>D × S × W dla 1 dorosłego osobnika |
| Temperatura w dzień | **25-30 °C** |
| Miejsce wygrzewania | **30-32 °C** |
| Temperatura w nocy | **22-25 °C** |
| Wilgotność | **50-70%** |
| UVB | **Opcjonalne** |
| Pokarm | **Owady** |
| Utrzymanie | **Pojedynczo lub w parach** |

#### ROZMNAŻANIE

| | |
|---|---|
| Rozmnażanie | **Jajorodny** |
| Dojrzałość płciowa | **6-12 miesięcy** |
| Wielkość zniesienia | **1-2 jaj** |
| Inkubacja | **46-62 dni**<br>przy 28-30 °C |

#### OCHRONA I FORMALNOŚCI

| | |
|---|---|
| CITES | **Niewymieniony** |
| Załącznik unijny | **Niewymieniony** |
| IUCN | **Niepoddany ocenie (NE)** |

## Hodowla w skrócie

| | |
|---|---|
| **TERRARIUM** | Pojedynczy dorosły *Hemidactylus frenatus* potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 40 × 30 × 40 cm (długość × szerokość × wysokość). Para powinna mieć co najmniej 60 × 40 × 40 cm i wiele kryjówek. |
| **TEMPERATURA** | W ciągu dnia utrzymuj w terrarium 25-30 °C, a w nocy 22-25 °C. Stwórz ciepłą strefę o temperaturze 30-32 °C, np. za pomocą małej żarówki grzewczej na jednym końcu, a przeciwległy koniec pozostaw chłodny, aby zwierzę mogło wybierać. |
| **WILGOTNOŚĆ I WODA** | Utrzymuj wilgotność powietrza na poziomie około 50-70 % i raz dziennie lekko zraszaj terrarium, najlepiej wieczorem, aby na liściach i kamieniach pojawiła się rosa. W ciągu dnia wilgotność powinna móc spadać. |
| **OŚWIETLENIE I UVB** | *Hemidactylus frenatus* jest aktywny o zmierzchu i w nocy, a nie ma udokumentowanych zaleceń dotyczących UVB. |
| **ŻYWIENIE** | W naturze *Hemidactylus frenatus* jest wszechstronnym łowcą. Owady i pająki stanowią większość jego diety: karaczany, termity, muchy, ćmy, chrząszcze, pszczoły i osy. |
| **ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM** | *Hemidactylus frenatus* jest szybki, nerwowy i nie należy go brać do rąk. W stresie może ugryźć, ale ugryzienie jest dość słabe i nieszkodliwe dla człowieka. |
| **NATURALNY ZASIĘG** | Indie, Sri Lanka, Bangladesz, Mjanma (Birma), Tajlandia, Kambodża, Laos, Wietnam, Malezja, Singapur, Indonezja i Filipiny. |