herpy

GEKONY

Banded velvet gecko

Homopholis fasciata

Masywny gekon o aksamitnej skórze z wschodnioafrykańskich sawann, z ciemnymi pręgami na grzbiecie oraz z lamelkami i pazurkami na palcach. Jest aktywny głównie nocą, kryje się w dziuplach dużych drzew, a zagrożony udaje martwego. Opieka jest opisana tylko w ogólnych zarysach.

Rodzina: Gekkonidae Dawna nazwa: *Platypholis fasciata; Homopholis erlangeri*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**9-11 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**8-12 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Nadrzewny**
Środowisko	**Sawanna**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**40 × 40 × 60 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**24-28 °C**
Miejsce wygrzewania	**28-32 °C**
Temperatura w nocy	**19-24 °C**
Wilgotność	**60-80%**
UVB	**Opcjonalne**
Zimowanie	**19-23 °C** 12-16 tygodni
Pokarm	**Owady**
Utrzymanie	**W parach lub jeden samiec z kilkoma samicami**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**2 jaj**
Zniesienia w roku	**4-5**
Inkubacja	**60-80 dni** przy 26-29 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM

Homopholis fasciata się wspina, dlatego para potrzebuje wysokiego terrarium o wymiarach co najmniej 40 × 40 × 60 cm (długość × szerokość × wysokość). Większe jest zawsze lepsze, zwłaszcza jeśli trzymasz więcej niż dwa zwierzęta.

TEMPERATURA

W dzień temperatura powinna wynosić 24-28 °C, a w terrarium powinno być cieplejsze miejsce z 28-32 °C, np. pod małą żarówką halogenową 10-20 W lub nad matą grzewczą. Nocą może spaść o 3-6 °C, do około 19-24 °C.

WILGOTNOŚĆ I WODA

Wilgotność powietrza powinna być umiarkowana do wysokiej, 60-80 %, z gradientem od jednego końca terrarium do drugiego.

OŚWIETLENIE I UVB

Gatunek jest aktywny o zmierzchu i nocą i bywa widoczny za dnia, ale w południe kryje się w cieniu. Używaj zwykłego oświetlenia dla roślin na wyłączniku czasowym, 12 godzin włączone i 12 godzin wyłączone.

ŻYWIENIE

Podstawą diety są świerszcze, uzupełniane karaczanami, mącznikami i innymi owadami odpowiedniej wielkości, tak by dieta była urozmaicona. Larwy barciaka można podawać od czasu do czasu. Owady muszą dać się połknąć bez trudu.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

Homopholis fasciata potrafi ugryźć i nie puszczać, a przestraszona udaje martwą i często pozostaje bez ruchu, więc nie bierz jej do ręki bez potrzeby. Daj nowym zwierzętom czas na aklimatyzację.

NATURALNY ZASIĘG

Etiopia, Kenia, Somalia i Tanzania.