herpy

GEKONY

Okavango dwarf gecko

Lygodactylus chobiensis

Jeden z największych gekonów karłowatych w rodzaju, do 44 mm od pyska do kloaki. *Lygodactylus chobiensis* jest niebieskoszary z dużymi jasnymi plamami i żółtym brzuchem, żyje na drzewach na sawannie wzdłuż rzek Chobe i Zambezi i można go trzymać w małym, wysokim i szczelnym terrarium.

Rodzina: Gekkonidae Dawna nazwa: *Lygodactylus picturatus chobiensis*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**3-4 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**5-10 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny**
Środowisko	**Sawanna**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**30 × 30 × 45 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**25-30 °C**
Miejsce wygrzewania	**30-35 °C**
Temperatura w nocy	**18-22 °C**
Wilgotność	**40-65%**
Woda	**Bez miski z wodą**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 2
Pokarm	**Owady i małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach lub jeden samiec z kilkoma samicami**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**9 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**2 jaj**
Inkubacja	**125 dni** przy 24-27 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o hodowli *Lygodactylus chobiensis* jest niewielka.
TEMPERATURA	*Lygodactylus chobiensis* to ciepłolubne zwierzę dzienne, a w terrarium musi być wyraźny gradient temperatur.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza powinna wynosić około 40-65 %, nieco mniej niż dla *Lygodactylus picturatus*, ponieważ w siedlisku panuje długa pora sucha. Ta wartość jest szacunkowa.
OŚWIETLENIE I UVB	*Lygodactylus chobiensis* jest aktywny w dzień i potrzebuje mocnego, równomiernego światła. Używaj świetlówek, najlepiej T5, i połącz świetlówkę UVB ze świetlówką dzienną, aby terrarium było jasne.
ŻYWIENIE	Na wolności *Lygodactylus chobiensis* żywi się głównie mrówkami i termitami. W terrarium musi dostawać żywe drobne owady: skoczogonki, muszki owocówki, małe świerszcze, świeżo wyklute strąkowce, małe karaczany i małe szarańcze.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Lygodactylus chobiensis* jest mały i szybki. Jak inne dzienne gekony karłowate często siedzi nieruchomo na gałęzi, po czym błyskawicznie rzuca się na owada karmowego.
NATURALNY ZASIĘG	Namibia, Botswana, Zambia, Zimbabwe, Mozambik i Malawi.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/gekony/lygodactylus-chobiensis