herpy

GEKONY

Grandidier's Madagascar ground gecko

Paroedura androyensis

Paroedura androyensis to najmniejszy gatunek w rodzaju madagaskarskich gekonów naziemnych: niewielki, nocny łowca ze ściółki leśnej południowego Madagaskaru. Dorasta zaledwie do 6-8 cm, podczas polowania energicznie macha ogonem i dobrze radzi sobie w małym terrarium. To sprawia, że jest dobrym wyborem dla początkujących, którzy chcą mieć małego i aktywnego gekona.

Rodzina: Gekkonidae Dawna nazwa: *Phyllodactylus androyensis*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**6-8 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**5-7 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Nadrzewny i naziemny**
Środowisko	**Suchy las**
Trudność	**Początkujący**

HODOWLA

Min. terrarium	**30 × 30 × 30 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**24-28 °C**
Temperatura w nocy	**21-24 °C**
Wilgotność	**50-70%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Opcjonalne**
Pokarm	**Owady i małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**Pojedynczo, w parach lub jeden samiec z kilkoma samicami**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**5-6 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**2 jaj**
Inkubacja	**60-90 dni** przy 25-26 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Narażony (VU)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Gatunek jest mały i terrarium o wymiarach 30 × 30 × 30 cm (długość × szerokość × wysokość) wystarczy dla jednego osobnika lub pary.
TEMPERATURA	W dzień temperatura powinna wynosić 24-28 °C, a w nocy może spaść do 21-24 °C, ale nie niżej. Jeśli w pomieszczeniu jest wystarczająco ciepło, źródło ciepła nie jest potrzebne.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza powinna wynosić 50-70 %. Lekko zraszaj terrarium codziennie lub co drugi dzień, tak aby na liściach, szybach i wystroju pozostawały krople wody, które zwierzę może pić.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek jest nocny i nie potrzebuje UVB, ale słabe oświetlenie UVB mu nie szkodzi. Słabe źródło światła na timerze, dające około 12 godzin dnia, zapewnia stały rytm dobowy.
ŻYWIENIE	*Paroedura androyensis* żywi się owadami, a ze względu na swoje rozmiary potrzebuje małych ofiar. Świeżo wyklute młode dostają świeżo wyklute świerszcze, a po kilku tygodniach świerszcze o wielkości 3 mm, najlepiej uzupełnione muszkami owocowymi, skoczogonkami i małymi prosionkami.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Na co dzień gatunek jest spokojny i powolny, ale potrafi szybko biegać, gdy się przestraszy lub poluje. Najlepiej nadaje się do obserwacji, a brać go do ręki należy rzadko i ostrożnie. Nigdy nie chwytaj za ogon.
NATURALNY ZASIĘG	Madagaskar.