herpy

GEKONY

Rüppell's semaphore gecko

Pristurus flavipunctatus

Mały, dzienny gekon z krajów położonych wokół południowej części Morza Czerwonego, o wysokim, piłkowanym ogonie i żółtych plamkach. Osiąga około 8 cm długości razem z ogonem, a wiedza o jego hodowli jest niemal żadna.

Rodzina: Sphaerodactylidae Dawna nazwa: *Pristurus percristatus; Pristurus gasperetti*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**7-8 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**5-8 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Skalny**
Środowisko	**Półpustynia i tereny skaliste**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**40 × 30 × 30 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**28-30 °C**
Miejsce wygrzewania	**40-45 °C**
Temperatura w nocy	**20-22 °C**
Wilgotność	**30-40%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Owady i małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**1 jaj**
Inkubacja	**70-90 dni** przy 28 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

O gatunku

Pristurus flavipunctatus to mały gekon o smukłym ciele, długich, cienkich nogach i ogonie, który jest dłuższy niż głowa i tułów, silnie spłaszczony bocznie i ma piłkowany kil wzdłuż górnej i dolnej krawędzi. U samców górny kil tworzy wyraźny grzebień. Strona grzbietowa jest jasnoszarobrązowa z mniej lub bardziej wyraźnymi ciemniejszymi poprzecznymi pasami i ciemnym paskiem biegnącym przez oko. Długość całkowita wynosi około 8 cm razem z ogonem; liczba ta opiera się na jednym zmierzonym osobniku.

Gatunek został opisany przez Eduarda Rüppella w 1835 roku z wybrzeża w okolicy Massawy w Erytrei i jest gatunkiem typowym rodzaju *Pristurus*. Nazwa rodzajowa pochodzi od greckiego *pristos*, piłowany, i *oura*, ogon, a nazwa gatunkowa od łacińskiego *flavus*, żółty, od żółtych plamek. Gatunek oddzielił się od kompleksu gatunków skupionego wokół *Pristurus rupestris* około 21 milionów lat temu. *P. percristatus* i *P. gasperetti* są dziś synonimami.

Gatunki z tego rodzaju są aktywne w dzień i sygnalizują ogonem oraz postawą ciała.

Występowanie i środowisko

Pristurus flavipunctatus występuje po obu stronach południowej części Morza Czerwonego. Po stronie afrykańskiej znany jest z Erytrei, Etiopii, Dżibuti, Somalii, Sudanu, Sudanu Południowego (dolina Neberet) i egipskiego wybrzeża Morza Czerwonego, a po stronie arabskiej z zachodniej Arabii Saudyjskiej, w tym z wysp Farasan. Miejscem typowym jest Massawa w Erytrei. Doniesienia z Jordanii są niepewne: zwierzęta z południowej Jordanii były wcześniej zaliczane do *P. flavipunctatus*, ale dziś uznaje się je za *Pristurus guweirensis*. Nie zostały uwzględnione na mapie.

Gatunek ma duży zasięg występowania i nie jest uznawany za zagrożony.

> **Naturalny zasięg:** Erytrea, Etiopia, Dżibuti, Somalia, Sudan, Sudan Południowy, Egipt i Arabia Saudyjska.

ŚRODOWISKO

Pristurus flavipunctatus zamieszkuje gorące, suche niziny i niskie góry wokół Morza Czerwonego i był notowany do wysokości co najmniej 460 m n.p.m. Opady są tam niewielkie, a temperatury w dzień są wysokie przez większą część roku. Siedlisko zostało opisane jedynie pobieżnie; gatunki z tego rodzaju żyją na ziemi, na kamieniach i skałach albo na drzewach i krzewach, a zwierzęta trzymają się blisko kryjówek. Temperatury ani wilgotności powietrza w siedlisku nie zmierzono dla tego gatunku.

Czytaj więcej: Wilgotność, zraszanie i wentylacja

Hodowla

TERRARIUM

O hodowli *Pristurus flavipunctatus* nie wiadomo prawie nic. Zalecenia opierają się na klimacie w zasięgu występowania oraz na *Pristurus carteri*, najlepiej poznanym w terrariach gatunku z tego rodzaju. Wartości dotyczące temperatury, długości życia i inkubacji zostały zapożyczone od *P. carteri*.

Dorosły osobnik potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 40 × 30 × 30 cm. Urządź je płaskimi kamieniami, łupkiem i korzeniami, tak aby powstały szczeliny i miejsca do wygrzewania na różnych wysokościach, a jako podłoże zastosuj drobny piasek zmieszany z ziemią. Kamienie muszą leżeć stabilnie i najlepiej być sklejone. Terrarium powinno mieć dobrą wentylację i szczelną pokrywę, bo zwierzę jest małe i szybkie.

Czytaj więcej: Inkubacja jaj

TEMPERATURA

Zapewnij gradient z 28-30 °C w chłodniejszej części i miejscem do wygrzewania o temperaturze 40-45 °C pod lampą punktową. W nocy temperatura może spaść do 20-22 °C. Używaj termometrów po obu stronach i termometru na podczerwień do pomiaru miejsca wygrzewania, a ogrzewanie steruj termostatem. Jeśli zwierzę stale szuka cienia, miejsce do wygrzewania jest za gorące.

Czytaj więcej: Ciepło i temperatura

WILGOTNOŚĆ I WODA

Powietrze powinno być suche, około 30-40 %. Podawaj bardzo płytką miseczkę ze świeżą wodą albo włóż do niej kamienie, aby zwierzę nie mogło się utopić, i raz w tygodniu lekko zraszaj wystrój, żeby zwierzęta mogły pić krople.

OŚWIETLENIE I UVB

P. flavipunctatus jest aktywny w dzień i potrzebuje silnego światła dziennego oraz UVB nad miejscem do wygrzewania, np. świetlówki T5. Strefa Fergusona 3 to szacunek dla dziennego gekona pustynnego. Utrzymuj oświetlenie przez 12 godzin dziennie latem i 9-10 godzin zimą, a świetlówkę UVB wymieniaj zgodnie z zaleceniami producenta.

Czytaj więcej: Światło i UVB

ŻYWIENIE

Gatunek zjada małe stawonogi. Podawaj skoczogonki, muszki owocowe, małe świerszcze i inne drobne owady, nie szersze niż głowa zwierzęcia. Dorosłe osobniki karm co drugi lub trzeci dzień, a młode codziennie, i usuwaj resztki po 15-20 minutach. Przy co drugim karmieniu oprószaj pokarm wapniem i witaminami. Pokarm w naturze nie został zbadany.

Czytaj więcej: Zwierzęta karmowe: utrzymanie i hodowla

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

Pristurus flavipunctatus jest szybki i czujny, nie nadaje się do brania na ręce, a ogon może się odłamać. Zachowanie zwierząt wobec siebie w niewoli nie zostało udokumentowane. Trzymaj je pojedynczo lub w parze w przestronnym terrarium z wieloma kryjówkami i nigdy nie trzymaj razem dwóch samców.

Rozmnażanie

DOJRZAŁOŚĆ PŁCIOWA I OKREŚLANIE PŁCI

Wiek i rozmiar w chwili osiągnięcia dojrzałości płciowej nie zostały udokumentowane dla *P. flavipunctatus*. Z rozmnażaniem poczekaj, aż zwierzęta będą w pełni wyrośnięte, a samica w dobrej kondycji.

GODY I KOPULACJA

Kopulacja w niewoli nie została opisana dla *P. flavipunctatus*. Samce z tego rodzaju sygnalizują ogonem i wyprostami przednich kończyn, ale nie zbadano, jaką rolę te sygnały odgrywają podczas godów. Obserwuj pierwszy kontakt i rozdziel zwierzęta, jeśli samiec uporczywie goni samicę.

SKŁADANIE JAJ I ZNIESIENIA

Nie udokumentowano, ile jaj składa samica tego gatunku ani jak często; u pozostałych gatunków z tego rodzaju składane jest jedno jajo o twardej skorupce naraz. Samica może przechowywać nasienie, więc może składać zapłodnione jaja długo po kopulacji. Zapewnij jej małą skrzynkę do składania jaj z wilgotnym piaskiem i zadbaj o obfitą ilość wapnia.

Czytaj więcej: Wapń, witaminy i suplementy

INKUBACJA

W temperaturze 28 °C wyklucie następuje po około 70-90 dniach; dane zapożyczono od *P. carteri*. Ostrożnie przenieś jaja, nie obracając ich, do lekko wilgotnego wermikulitu i utrzymuj stałą temperaturę.

ODCHÓW MŁODYCH

Odchów młodych nie został udokumentowany. Młode są bardzo małe i potrzebują najmniejszych owadów karmowych, takich jak muszki owocowe i świeżo wyklute świerszcze, a także wapnia i UVB.

Zdrowie i częste błędy

Nie udokumentowano chorób specyficznych dla *Pristurus flavipunctatus* w niewoli. Typowe błędy w przypadku małych, dziennych gekonów pustynnych to:

- Za mało UVB i wapnia, co może prowadzić do miękkich kości i drżenia.
- Zbyt wysoka wilgotność i słaba wentylacja.
- Przegrzanie pod zbyt mocną lampą bez chłodnej strefy.
- Utrata ogona w wyniku stresu lub przytrzymywania.

Zdrowe zwierzę jest szybkie i czujne, ma jasne oczy. Zgłoś się do weterynarza z doświadczeniem w leczeniu gadów, jeśli zwierzę traci na wadze lub leży bezwładnie.

Zawsze pytaj kogoś, kto się zna

Ten poradnik to dobry punkt wyjścia, ale nie zastąpi doświadczenia. Zwierzęta są różne, a wielu najważniejszych rzeczy można się nauczyć tylko od ludzi, którzy od lat hodują dany gatunek. Porozmawiaj z hodowcą, doświadczonym terrarystą lub weterynarzem, który zna gady i płazy, zanim kupisz zwierzę - i ponownie, gdy coś wygląda niepokojąco.