herpy

GEKONY

Morocco lizard-fingered gecko

Saurodactylus brosseti

Saurodactylus brosseti to bardzo mały, naziemny gekon z zachodniego Maroka. Ciało mierzy około 3 cm od pyska do kloaki, a zwierzę jest aktywne w dzień i o zmierzchu. Gatunek stanowi kompleks gatunków kryptycznych i jest prawie nieznany w niewoli, dlatego ten poradnik opiera się na klimacie panującym w zasięgu jego występowania.

Rodzina: Sphaerodactylidae Dawna nazwa: *Saurodactylus mauritanicus brosseti; Saurodactylus fasciatus brosseti*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**3 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**5-10 lat**
Aktywność	**Za dnia i o zmierzchu**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Półpustynia i tereny skaliste**
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**40 × 30 × 30 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**22-28 °C**
Miejsce wygrzewania	**30-32 °C**
Temperatura w nocy	**12-18 °C**
Wilgotność	**40-60%**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Owady i małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**1 jaj**
Inkubacja	**60-90 dni** przy 24-28 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	O hodowli *Saurodactylus brosseti* nie wiadomo prawie nic. Klimat w zasięgu występowania jest śródziemnomorski, z gorącymi, suchymi latami i łagodnymi, wilgotniejszymi zimami, a sam gatunek to bardzo mały, naziemny gekon.
TEMPERATURA	W dzień utrzymuj przy podłożu 22-28 °C z małym miejscem do wygrzewania o temperaturze 30-32 °C pod słabą lampą punktową sterowaną termostatem. W nocy temperatura spada do 12-18 °C.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza powinna wynosić 40-60 %. Lekko zraszaj terrarium co dwa-trzy dni, tak aby na kamieniach i liściach pozostawały krople, które zwierzę może pić, i pozwól mu przeschnąć między zraszaniami.
OŚWIETLENIE I UVB	*Saurodactylus brosseti* jest aktywny w dzień i o zmierzchu.
ŻYWIENIE	W naturze gatunek żywi się małymi stawonogami. Owady karmowe muszą być bardzo małe, nie większe niż głowa zwierzęcia: skoczogonki, muszki owocowe, świeżo wyklute świerszcze i małe prosionki.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Gatunek poluje z zasadzki: siedzi nieruchomo i atakuje, gdy w pobliżu pojawi się mały owad. Zachowanie w niewoli nie zostało udokumentowane. Trzymaj zwierzę pojedynczo albo w parze w przestronnym terrarium z wieloma kryjówkami.
NATURALNY ZASIĘG	Maroko.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/gekony/saurodactylus-brosseti