herpy

GEKONY

Middle Eastern short-fingered gecko

Stenodactylus doriae

Jeden z największych gatunków w rodzaju *Stenodactylus*: smukły, nocny gatunek naziemny o długich nogach i palcach z frędzlami, który w ciągu dnia zakopuje się w piasku. Wiedza o jego hodowli jest skąpa, ale można go trzymać tak jak najbliższych krewnych, w suchym terrarium z piaskiem.

Rodzina: Gekkonidae Dawna nazwa: *Ceramodactylus doriae; Ceramodactylus major; Stenodactylus major*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**5-8 cm** długość od pyska do kloaki
Waga	**5-11 g**
Długość życia	**9-10 lat**
Aktywność	**W nocy**
Tryb życia	**Naziemny i kopiący nory**
Środowisko	**Pustynia**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 40 × 20 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**24-29 °C**
Miejsce wygrzewania	**35-38 °C**
Temperatura w nocy	**18-24 °C**
Wilgotność	**40-60%**
UVB	**Opcjonalne**
Pokarm	**Owady**
Utrzymanie	**Pojedynczo, w parach lub jeden samiec z kilkoma samicami**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**8 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**1-2 jaj**
Inkubacja	**60-80 dni** przy 27-30 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM

Wiedza o hodowli *Stenodactylus doriae* jest skąpa. Urządzenie terrarium wzorowane jest na najbliższych krewnych, *Stenodactylus petrii* i *Stenodactylus sthenodactylus*, pochodzących z tych samych pustyń.

TEMPERATURA

W dzień w terrarium powinno być 24-29 °C, a w najcieplejszym miejscu 35-38 °C, np. nad matą grzewczą lub kablem grzewczym pod dnem albo pod lampą na jednym końcu.

WILGOTNOŚĆ I WODA

Wilgotność powietrza powinna być niska do umiarkowanej, około 40-60 %. Raz lub dwa razy w tygodniu wieczorem lekko zraszaj część terrarium, tak aby powstały wilgotne miejsca i krople wody, a resztę zostaw suchą.

OŚWIETLENIE I UVB

Gatunek jest nocny i może żyć bez UVB, jeśli z pokarmem dostaje wapń z witaminą D3. Słabe oświetlenie UVB nad częścią terrarium jest opcjonalne, o ile zwierzęta mogą zakopać się w cieniu.

ŻYWIENIE

Podstawą diety są żywe owady, głównie świerszcze, uzupełniane larwami barciaka, mącznikami, mini-mącznikami i nielotnymi muszkami owocowymi. Owady mogą być co najwyżej tak szerokie jak głowa gekona.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

Stenodactylus doriae nie nadaje się do brania do ręki. Jest szybki i delikatny, a ogon może zostać odrzucony. Zwierzęta wychodzą po zmroku, a dzień spędzają w swoich korytarzach.

NATURALNY ZASIĘG

Arabia Saudyjska, Katar, Iran, Irak, Izrael, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Jordania i Kuwejt.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/gekony/stenodactylus-doriae