herpy

GEKONY

## Southern spiny-tailed gecko

# *Strophurus intermedius*

*Strophurus intermedius* to masywnie zbudowany gekon z grupy gekonów kolczastoogonowych, pochodzący z półsuchych zarośli mallee i lasów południowej Australii. Na grzbiecie i ogonie ma dwa rzędy pomarańczowobrązowych guzków, a w razie zagrożenia wystrzykuje z ogona lepką, cuchnącą ciecz. Wspina się po krzewach i drzewach, ale dużo czasu spędza też na ziemi.

Rodzina: Diplodactylidae  Dawna nazwa: *Diplodactylus intermedius*

### NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

#### ZWIERZĘ

| | |
|---|---|
| Wielkość dorosłego osobnika | **6-8 cm**<br>długość od pyska do kloaki |
| Długość życia | **4-10 lat** |
| Aktywność | **O zmierzchu i w nocy** |
| Tryb życia | **Nadrzewny i naziemny** |
| Środowisko | **Półpustynia i sawanna** |
| Trudność | **Średnio zaawansowany** |

#### HODOWLA

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **30 × 30 × 45 cm**<br>D × S × W dla 2 dorosłych osobników |
| Temperatura w dzień | **25-30 °C** |
| Miejsce wygrzewania | **30-32 °C** |
| Temperatura w nocy | **18-25 °C** |
| Wilgotność | **40-60%** |
| UVB | **Zalecane**<br>Strefa Fergusona 2 |
| Pokarm | **Owady** |
| Utrzymanie | **Pojedynczo, w parach lub jeden samiec z kilkoma samicami** |

#### ROZMNAŻANIE

| | |
|---|---|
| Rozmnażanie | **Jajorodny** |
| Dojrzałość płciowa | **24-36 miesięcy** |
| Wielkość zniesienia | **1-2 jaj** |
| Zniesienia w roku | **2-5** |
| Inkubacja | **45-60 dni**<br>przy 27-30 °C |

#### OCHRONA I FORMALNOŚCI

| | |
|---|---|
| CITES | **Załącznik III** |
| Załącznik unijny | **Załącznik C** |
| IUCN | **Najmniejszej troski (LC)** |

## Hodowla w skrócie

| | |
|---|---|
| **TERRARIUM** | Gekony kolczastoogonowe dobrze wykorzystują przestrzeń, więc terrarium nie musi być duże. Parę można trzymać w terrarium 30 × 30 × 45 cm (długość × szerokość × wysokość), a samiec z kilkoma samicami potrzebuje więcej miejsca. |
| **TEMPERATURA** | Zapewnij 25-30 °C w dzień i miejsce do wygrzewania o temperaturze 30-32 °C wysoko na gałęzi. Na noc wyłącz grzanie; temperatura może wtedy spaść do 18-25 °C. Wartości zaczerpnięto od pozostałych gatunków z rodzaju. |
| **WILGOTNOŚĆ I WODA** | Wilgotność powietrza powinna być umiarkowana, około 40-60 %, a terrarium w ciągu dnia musi całkowicie wyschnąć. |
| **OŚWIETLENIE I UVB** | Gatunek od czasu do czasu się wygrzewa, więc UVB jest korzystne, zwłaszcza dla młodych i samic rozpłodowych. |
| **ŻYWIENIE** | W naturze *Strophurus intermedius* żywi się wyłącznie stawonogami: pająkami, skolopendrami, skorpionami, karaczanami, świerszczami, chrząszczami i ich larwami. |
| **ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM** | *Strophurus intermedius* to zwierzę do obserwowania i nie należy brać go do ręki częściej, niż to absolutnie konieczne. Może wystrzyknąć swoją lepką, cuchnącą ciecz i może odrzucić ogon. Nigdy nie chwytaj go za ogon. |
| **NATURALNY ZASIĘG** | Australia. |

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/gekony/strophurus-intermedius