herpy

GEKONY

South-western spiny-tailed gecko

Strophurus spinigerus

Strophurus spinigerus to niewielki gekon z grupy gekonów kolczastoogonowych, pochodzący z południowo-zachodniej Australii. Jest oliwkowoszary, ma dwa rzędy czarnych kolców na ogonie, a często także szeroki, ząbkowany czarny pas biegnący wzdłuż grzbietu. Nocą wspina się po krzewach i drzewach, a przestraszony potrafi wystrzyknąć z ogona lepką, cuchnącą ciecz.

Rodzina: Diplodactylidae Dawna nazwa: *Diplodactylus spinigerus*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**9-11 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**6-10 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Nadrzewny i naziemny**
Środowisko	**Półpustynia i lasy i łąki strefy umiarkowanej**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**30 × 30 × 45 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**25-30 °C**
Miejsce wygrzewania	**30-32 °C**
Temperatura w nocy	**18-25 °C**
Wilgotność	**40-60%**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 2
Pokarm	**Owady**
Utrzymanie	**Pojedynczo, w parach lub jeden samiec z kilkoma samicami**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**12-24 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**1-2 jaj**
Zniesienia w roku	**2-6**
Inkubacja	**45-60 dni** przy 27-30 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik III**
Załącznik unijny	**Załącznik C**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o utrzymaniu *Strophurus spinigerus* jest skąpa. Hodowla opiera się więc na pozostałych gekonach kolczastoogonowych, które żyją w podobny sposób w krzewach i na drzewach i których wymagania są dobrze znane, np.
TEMPERATURA	W dzień temperatura powinna wynosić 25-30 °C, a na wysoko umieszczonej gałęzi powinno być miejsce do wygrzewania o temperaturze 30-32 °C. Na noc ogrzewanie się wyłącza, a temperatura może spaść do 18-25 °C.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza powinna być umiarkowana, około 40-60 %, a terrarium musi w ciągu dnia całkowicie wyschnąć.
OŚWIETLENIE I UVB	W naturze gatunek wygrzewa się wśród cienkich gałęzi, więc UVB jest korzystne.
ŻYWIENIE	W naturze przedstawiciele rodzaju żywią się stawonogami: pająkami, karaczanami, świerszczami, chrząszczami, termitami i ich larwami. W terrarium sprawdzają się małe świerszcze, karaczany, ćmy, muchy i larwy barciaka.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Strophurus spinigerus* to zwierzę do obserwowania i nie należy go brać na ręce częściej, niż to absolutnie konieczne. Może wystrzyknąć swoją lepką, cuchnącą ciecz i może stracić ogon, więc nigdy nie chwytaj go za ogon.
NATURALNY ZASIĘG	Australia.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/gekony/strophurus-spinigerus