herpy

GEKONY

## Eastern spiny-tailed gecko

# *Strophurus williamsi*

*Strophurus williamsi* to niewielki gatunek nadrzewny z suchego interioru wschodniej Australii. Grzbiet i ogon pokrywają żółtopomarańczowe kolce, a w razie zagrożenia gekon wystrzykuje z ogona lepką, cuchnącą ciecz. W ciągu dnia chętnie wygrzewa się w słońcu, ale poluje głównie o zmierzchu i w nocy. O hodowli właśnie tego gatunku istnieje niewiele wiarygodnych informacji, dlatego najlepiej sprawdzi się u doświadczonych hodowców.

Rodzina: Diplodactylidae  Dawna nazwa: *Diplodactylus williamsi*

### NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

#### ZWIERZĘ

| | |
|---|---|
| Wielkość dorosłego osobnika | **10-13 cm**<br>długość całkowita z ogonem |
| Długość życia | **4-10 lat** |
| Aktywność | **Za dnia, o zmierzchu i w nocy** |
| Tryb życia | **Nadrzewny** |
| Środowisko | **Półpustynia i sawanna** |
| Trudność | **Doświadczony** |

#### HODOWLA

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **45 × 45 × 60 cm**<br>D × S × W dla 1 dorosłego osobnika |
| Temperatura w dzień | **25-30 °C** |
| Miejsce wygrzewania | **30-32 °C** |
| Temperatura w nocy | **18-25 °C** |
| Wilgotność | **40-60%** |
| UVB | **Zalecane**<br>Strefa Fergusona 2 |
| Pokarm | **Owady** |
| Utrzymanie | **Pojedynczo lub w parach** |

#### ROZMNAŻANIE

| | |
|---|---|
| Rozmnażanie | **Jajorodny** |
| Wielkość zniesienia | **1-2 jaj** |
| Zniesienia w roku | **2-5** |
| Inkubacja | **43-80 dni**<br>przy 27-30 °C |

#### OCHRONA I FORMALNOŚCI

| | |
|---|---|
| CITES | **Załącznik III** |
| Załącznik unijny | **Załącznik C** |
| IUCN | **Najmniejszej troski (LC)** |

## Hodowla w skrócie

| | |
|---|---|
| **TERRARIUM** | Wiedza o hodowli *Strophurus williamsi* jest skąpa, dlatego wartości podane w częściach o hodowli opierają się na danych dla rodzaju, zwłaszcza dla blisko spokrewnionych *Strophurus ciliaris* i *Strophurus taenicauda*. |
| **TEMPERATURA** | *Strophurus williamsi* jest ciepłolubny i żyje w klimacie o dużych dobowych wahaniach. |
| **WILGOTNOŚĆ I WODA** | Dla *Strophurus williamsi* wilgotność powietrza powinna być umiarkowana, około 40-60 %, a terrarium w ciągu dnia musi całkowicie wyschnąć. |
| **OŚWIETLENIE I UVB** | *Strophurus williamsi* wygrzewa się w naturze w słońcu, więc korzysta z UVB. |
| **ŻYWIENIE** | W naturze *Strophurus williamsi* żywi się stawonogami, zwłaszcza świerszczami, konikami polnymi, ćmami, pająkami i termitami. |
| **ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM** | *Strophurus williamsi* to przede wszystkim zwierzę do obserwacji. Jest szybki i nerwowy i nie należy brać go do ręki częściej, niż to absolutnie konieczne. |
| **NATURALNY ZASIĘG** | Australia. |

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/gekony/strophurus-williamsi