herpy

JASZCZURKI WŁAŚCIWE

## Asian Grass Lizard

# *Takydromus sexlineatus*

*Takydromus sexlineatus* to smukła, aktywna w dzień jaszczurka o niezwykle długim ogonie, żyjąca w wysokiej trawie i niskiej roślinności w Azji Południowo-Wschodniej. Osiąga 20-30 cm, z czego zdecydowaną większość stanowi ogon, i żywi się drobnymi owadami. Gatunek jest tropikalny i nie wymaga zimowania, ale szybko się odwadnia i potrzebuje wysokiego, gęsto obsadzonego roślinami terrarium o umiarkowanej wilgotności.

Rodzina: Lacertidae

### NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

#### ZWIERZĘ

| | |
|---|---|
| Wielkość dorosłego osobnika | **20-30 cm**<br>długość całkowita z ogonem |
| Długość życia | **5-7 lat** |
| Aktywność | **Za dnia** |
| Tryb życia | **Nadrzewny i naziemny** |
| Środowisko | **Sawanna** |
| Trudność | **Średnio zaawansowany** |

#### HODOWLA

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **60 × 40 × 60 cm**<br>D × S × W dla 2 dorosłych osobników |
| Temperatura w dzień | **25-30 °C** |
| Miejsce wygrzewania | **34-40 °C** |
| Temperatura w nocy | **20-23 °C** |
| Wilgotność | **60-70%** |
| Woda | **Miska z wodą** |
| UVB | **Zalecane**<br>Strefa Fergusona 2 |
| Pokarm | **Owady** |
| Utrzymanie | **W parach lub jeden samiec z kilkoma samicami** |

#### ROZMNAŻANIE

| | |
|---|---|
| Rozmnażanie | **Jajorodny** |
| Wielkość zniesienia | **1-4 jaj** |
| Zniesienia w roku | **2-5** |
| Inkubacja | **40 dni**<br>przy 26 °C |

#### OCHRONA I FORMALNOŚCI

| | |
|---|---|
| CITES | **Niewymieniony** |
| Załącznik unijny | **Niewymieniony** |
| IUCN | **Najmniejszej troski (LC)** |

## Hodowla w skrócie

| | |
|---|---|
| **TERRARIUM** | Małe szklane terrarium to za mało dla *Takydromus sexlineatus*, mimo że zwierzę jest niewielkie. Para potrzebuje co najmniej 60 × 40 × 60 cm (długość × szerokość × wysokość), a samiec z dwiema samicami co najmniej 90 × 60 × 60 cm. |
| **TEMPERATURA** | Najważniejszy jest gradient. Temperatura w dzień wynosi 25-30 °C, a na stanowisku do wygrzewania powierzchnia ma 34-40 °C, mierzone termometrem na podczerwień. |
| **WILGOTNOŚĆ I WODA** | Wilgotność powietrza powinna wynosić 60-70 %. Zraszaj terrarium wodą dwa razy dziennie, żeby zwierzęta mogły pić krople z liści i ścian i żeby utrzymać wilgotność. |
| **OŚWIETLENIE I UVB** | *Takydromus sexlineatus* jest aktywny w dzień. Terrarium powinno mieć mały promiennik i oświetlenie UVB. |
| **ŻYWIENIE** | *Takydromus sexlineatus* jest owadożerny i zjada małe żywe owady. Pokarm to małe świerszcze, muchy, muszki owocowe, skoczogonki, mączniki, larwy barciaka, małe szarańcze i małe karaczany. |
| **ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM** | *Takydromus sexlineatus* jest szybki, płochliwy i jest zwierzęciem do obserwacji. |
| **NATURALNY ZASIĘG** | Indie, Chiny, Mjanma (Birma), Tajlandia, Laos, Kambodża, Wietnam, Malezja i Indonezja. |