herpy

KAMELEONY

## Brown Leaf Chameleon

# *Brookesia superciliaris*

*Brookesia superciliaris* to jeden z największych kameleonów liściowych, osiągający 9-10 cm całkowitej długości. Żyje w ściółce wschodnich lasów deszczowych Madagaskaru, jest brązowy jak suchy liść i ma duże kostne guzy nad oczami. Gatunek trzyma się w małym, wilgotnym terrarium z grubą warstwą liści i drobnymi owadami karmowymi. Uchodzi za trudny, ale obecnie jest regularnie rozmnażany w niewielkich liczbach.

Rodzina: Chamaeleonidae  Dawna nazwa: *Chamaeleo superciliaris*

### NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

#### ZWIERZĘ

| | |
|---|---|
| Wielkość dorosłego osobnika | **9-10 cm**<br>długość całkowita z ogonem |
| Długość życia | **2-4 lat** |
| Aktywność | **Za dnia** |
| Tryb życia | **Nadrzewny i naziemny** |
| Środowisko | **Las deszczowy i las górski** |
| Trudność | **Doświadczony** |

#### HODOWLA

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **40 × 30 × 40 cm**<br>D × S × W dla 1 dorosłego osobnika |
| Temperatura w dzień | **20-25 °C** |
| Temperatura w nocy | **16-20 °C** |
| Wilgotność | **70-95%** |
| UVB | **Zalecane**<br>Strefa Fergusona 1 |
| Pokarm | **Owady i małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)** |
| Utrzymanie | **Pojedynczo** |

#### ROZMNAŻANIE

| | |
|---|---|
| Rozmnażanie | **Jajorodny** |
| Dojrzałość płciowa | **4-5 miesięcy** |
| Wielkość zniesienia | **2-5 jaj** |
| Zniesienia w roku | **2-3** |
| Inkubacja | **45-120 dni**<br>przy 18-27 °C |

#### OCHRONA I FORMALNOŚCI

| | |
|---|---|
| CITES | **Załącznik II** |
| Załącznik unijny | **Załącznik B** |
| IUCN | **Najmniejszej troski (LC)** |

## Hodowla w skrócie

| | |
|---|---|
| **TERRARIUM** | Wiedza o hodowli *Brookesia superciliaris* jest skąpa. Gatunek długo uchodził za trudny w utrzymaniu i niemal niemożliwy do rozmnażania przez kilka pokoleń, ale obecnie jest regularnie rozmnażany, choć w niewielkich liczbach. |
| **TEMPERATURA** | Temperatura w dzień powinna wynosić 20-25 °C, a w nocy 16-20 °C, jak w górskim lesie deszczowym. Nocny spadek następuje sam po zgaszeniu lamp. |
| **WILGOTNOŚĆ I WODA** | Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-95 %, najwyższa tuż po zraszaniu i w nocy. Zraszaj terrarium obficie co najmniej dwa razy dziennie letnią wodą. Zwierzęta piją krople z liści i nie korzystają z miski. |
| **OŚWIETLENIE I UVB** | Gatunek jest dzienny i żyje w cieniu. |
| **ŻYWIENIE** | Gatunek zjada drobne owady: muszki owocowe, skoczogonki, małe świerszcze, strąkowce i małe karaczany. Ofiara może mieć najwyżej około 20 % długości ciała zwierzęcia. |
| **ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM** | Gatunek trzyma się pojedynczo. Jest płochliwy, ale ruchliwy i łatwo się stresuje niepokojeniem i dotykiem, dlatego nie należy brać go na rękę. W razie zagrożenia może wibrować. |
| **NATURALNY ZASIĘG** | Madagaskar. |