herpy

KAMELEONY

Kameleon dywanowy

Furcifer lateralis

Furcifer lateralis to mały, barwny kameleon z lasów, zarośli i ogrodów Madagaskaru. Samica jest wyjątkowo intensywnie ubarwiona, zwłaszcza gdy jest ciężarna. Gatunek osiąga zaledwie 17-25 cm, dojrzewa w ciągu kilku miesięcy i żyje tylko 2-3 lata, a niewielkie rozmiary sprawiają, że jest to kameleon przystępny dla doświadczonego hodowcy.

Rodzina: Chamaeleonidae Nazwa angielska: Carpet Chameleon Dawna nazwa: *Chamaeleo lateralis; Chamaeleo lambertoni*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**17-25 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**2-3 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny**
Środowisko	**Sawanna i las deszczowy**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**24-29 °C**
Miejsce wygrzewania	**32-35 °C**
Temperatura w nocy	**18-22 °C**
Wilgotność	**60-100%**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Owady**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**3-6 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**6-23 jaj**
Zniesienia w roku	**3-6**
Inkubacja	**150-400 dni** przy 20-25 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Dorosłe zwierzę potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 45 × 45 × 60 cm (długość × szerokość × wysokość).
TEMPERATURA	Temperatura w dzień powinna wynosić 24-29 °C.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza powinna wynosić 60-100 %. Terrarium może w ciągu dnia przesychać, o ile powietrze pozostaje stosunkowo wilgotne, a zwierzę może codziennie pić.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek jest aktywny w dzień i lubi słońce, dlatego wymaga silnego światła i UVB.
ŻYWIENIE	*F. lateralis* jest wyłącznie owadożerny. Ofiara powinna mieć mniej więcej taką długość jak odległość między oczami; mącznik może być dłuższy.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Gatunek trzyma się pojedynczo. Samce są agresywne i terytorialne, a samice łatwo się stresują. Zwierzęta mogą się nawzajem gryźć, dlatego kopulację trzeba nadzorować, a po jej zakończeniu rozdzielić zwierzęta.
NATURALNY ZASIĘG	Madagaskar.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/kameleony/furcifer-lateralis