herpy

KAMELEONY

## Lesser Chameleon

# *Furcifer minor*

*Furcifer minor* to niewielki kameleon z centralnych wyżyn Madagaskaru. Samiec jest beżowo-brązowy i ma dwa rogi na nosie, natomiast to samica jest kolorowa, zwłaszcza gdy nosi jaja. Gatunek osiąga 16-23 cm długości całkowitej, jest zagrożony w naturze i rzadko spotykany w hodowli. Wymaga hodowcy z doświadczeniem w utrzymaniu kameleonów, przede wszystkim dlatego, że u samic łatwo dochodzi do problemów ze składaniem jaj.

Rodzina: Chamaeleonidae  Dawna nazwa: *Chamaeleo minor*

### NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

#### ZWIERZĘ

| | |
|---|---|
| Wielkość dorosłego osobnika | **16-23 cm**<br>długość całkowita z ogonem |
| Długość życia | **2-4 lat** |
| Aktywność | **Za dnia** |
| Tryb życia | **Nadrzewny** |
| Środowisko | **Sawanna, suchy las i las górski** |
| Trudność | **Doświadczony** |

#### HODOWLA

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **45 × 45 × 60 cm**<br>D × S × W dla 1 dorosłego osobnika |
| Temperatura w dzień | **21-26 °C** |
| Miejsce wygrzewania | **32-38 °C** |
| Temperatura w nocy | **15-20 °C** |
| Wilgotność | **60-100%** |
| UVB | **Niezbędne**<br>Strefa Fergusona 3 |
| Pokarm | **Owady** |
| Utrzymanie | **Pojedynczo** |

#### ROZMNAŻANIE

| | |
|---|---|
| Rozmnażanie | **Jajorodny** |
| Dojrzałość płciowa | **5-9 miesięcy** |
| Wielkość zniesienia | **4-18 jaj** |
| Zniesienia w roku | **1-3** |
| Inkubacja | **190-270 dni**<br>przy 22-24 °C |

#### OCHRONA I FORMALNOŚCI

| | |
|---|---|
| CITES | **Załącznik II** |
| Załącznik unijny | **Załącznik B** |
| IUCN | **Zagrożony (EN)** |

## Hodowla w skrócie

| | |
|---|---|
| **TERRARIUM** | Dorosłe zwierzę potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 45 × 45 × 60 cm (długość × szerokość × wysokość). |
| **TEMPERATURA** | Temperatura w dzień powinna wynosić 21-26 °C. Zapewnij miejsce do wygrzewania o temperaturze 32-38 °C, mierzonej jako temperatura powierzchni termometrem na podczerwień, a dół terrarium pozostaw chłodniejszy. |
| **WILGOTNOŚĆ I WODA** | Wilgotność powietrza powinna wynosić 60-100 %. Gatunek pochodzi z obszaru o wysokiej wilgotności, jednak terrarium musi w ciągu dnia przeschnąć, aby uniknąć stojącej wody i chorób. |
| **OŚWIETLENIE I UVB** | Gatunek jest aktywny w dzień, lubi słońce i wymaga mocnego oświetlenia. |
| **ŻYWIENIE** | *F. minor* jest wyłącznie owadożerny. Podawaj urozmaicony pokarm: świerszcze, karaczany, strąkowce i muszki owocowe. |
| **ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM** | Gatunek trzyma się pojedynczo, a dwa osobniki łączy się tylko do kopulacji. Zwierzęta są agresywne wobec przedstawicieli własnego gatunku, również młode, i mogą poważnie się nawzajem okaleczyć. |
| **NATURALNY ZASIĘG** | Madagaskar. |

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/kameleony/furcifer-minor