herpy

KAMELEONY

Kameleon Jacksona

Trioceros jacksonii

Trioceros jacksonii to średniej wielkości kameleon z górskich lasów Kenii i Tanzanii. Samiec ma trzy rogi skierowane do przodu, a samica zamiast składać jaja rodzi żywe młode. Gatunek wymaga chłodnych nocy, wysokiej wilgotności nocą i starannej opieki, dlatego jest przeznaczony raczej dla doświadczonych hodowców.

Rodzina: Chamaeleonidae Nazwa angielska: Jackson's Chameleon Dawna nazwa: *Chamaeleo jacksonii; Chamaeleon jacksonii*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**15-38 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**5-9 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny**
Środowisko	**Las górski**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 60 × 120 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**20-24 °C**
Miejsce wygrzewania	**27-30 °C**
Temperatura w nocy	**10-15 °C**
Wilgotność	**40-100%**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Owady**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Żyworodny**
Dojrzałość płciowa	**5-12 miesięcy**
Wielkość miotu	**8-30 młodych**
Ciąża	**150-180 dni**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM

Dorosłe zwierzę potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 60 × 60 × 120 cm (długość × szerokość × wysokość). Wysokość jest ważniejsza od powierzchni dna, ponieważ gatunek wykorzystuje całą wysokość.

TEMPERATURA

Gatunek pochodzi z wyżyn i źle znosi upał. Temperatura w terrarium w dzień powinna wynosić 20-24 °C. W miejscu do wygrzewania pod lampą powinno być 27-30 °C.

WILGOTNOŚĆ I WODA

Wilgotność powietrza powinna odpowiadać dobowemu rytmowi gatunku: około 90-100 % nocą i 40-50 % w dzień. Stałe 60-80 % nie jest właściwe i może wywołać chorobę. Wszystkie powierzchnie powinny w ciągu dnia wyschnąć.

OŚWIETLENIE I UVB

Gatunek jest aktywny w dzień i potrzebuje dużo światła. Świetlówka T5 HO 6500 K lub mocna lampa LED na całą szerokość terrarium zapewnia oświetlenie. Długość dnia wynosi 12 godzin przez cały rok, ponieważ Kenia leży blisko równika.

ŻYWIENIE

T. jacksonii jest owadożerny. Ofiara może być najwyżej tak duża jak odległość między oczami. Urozmaicaj dietę: szarańcza, świerszcze, nimfy karaczanów, muchy i małe chrząszcze.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

Gatunek trzyma się pojedynczo przez całe życie. Samce są terytorialne i nigdy nie powinny się widzieć. Dwa zwierzęta łączy się tylko wtedy, gdy samicę przenosi się do samca w celu kopulacji.

NATURALNY ZASIĘG

Kenia i Tanzania.