herpy

KAMELEONY

Meller's Chameleon

Trioceros melleri

Trioceros melleri to największy kameleon kontynentalnej Afryki. Osiąga do 60 cm długości, nosi na pysku pojedynczy mały róg i zamieszkuje zakrzewione sawanny oraz widne lasy w Tanzanii, Malawi i Mozambiku. Gatunek wymaga dużo miejsca, obfitości wody oraz chłodnych, wilgotnych nocy i nadaje się wyłącznie dla doświadczonego hodowcy.

Rodzina: Chamaeleonidae Dawna nazwa: *Chamaeleo melleri; Ensirostris melleri*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**30-60 cm** długość całkowita z ogonem
Waga	**300-500 g**
Długość życia	**5-14 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny**
Środowisko	**Sawanna i suchy las**
Trudność	**Ekspert**

HODOWLA

Min. terrarium	**120 × 90 × 150 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**22-28 °C**
Miejsce wygrzewania	**29-32 °C**
Temperatura w nocy	**15-20 °C**
Wilgotność	**40-100%**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 2
Pokarm	**Owady**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**15-80 jaj**
Zniesienia w roku	**1**
Inkubacja	**180-270 dni** przy 24-26 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Dorosłe zwierzę potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 120 × 90 × 150 cm (długość × szerokość × wysokość), a większe jest lepsze.
TEMPERATURA	Temperatura w terrarium w dzień powinna wynosić 22-28 °C, a w miejscu do wygrzewania pod lampą 29-32 °C. Zwierzęta z wybrzeża Tanzanii najlepiej czują się w cieplejszej części tego zakresu.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza powinna podążać za rytmem dobowym: 40-50 % w dzień i ponad 90 % w nocy. Stała wilgoć prowadzi do infekcji dróg oddechowych i grzybic, dlatego wszystkie powierzchnie muszą w ciągu dnia wyschnąć.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek jest aktywny w dzień i potrzebuje silnego światła przez 12 godzin na dobę.
ŻYWIENIE	*T. melleri* jest owadożerny. Podawaj urozmaicone, duże owady karmowe: świerszcze, szarańczę, karaczany, poczwarki jedwabnika, patyczaki i larwy muchy czarnej (BSF).
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Gatunek trzyma się pojedynczo przez całe życie. Samce są silnie terytorialne i nawet para w dużym terrarium sprawia problemy; dwa zwierzęta łączy się tylko na krótko w celu kopulacji.
NATURALNY ZASIĘG	Malawi, Mozambik i Tanzania.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/kameleony/trioceros-melleri