herpy

LEGWANY

anolis zielony

Anolis carolinensis

Anolis carolinensis to smukła, wspinająca się jaszczurka z południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych, która zmienia barwę z zielonej na brązową i odwrotnie w zależności od temperatury, światła i nastroju. Osiąga 12-20 cm długości razem z ogonem, jest aktywna w dzień i żywi się drobnymi owadami. Wymaga wysokiego, jasnego i wilgotnego terrarium z UVB i ciepłym miejscem do wygrzewania się, a samca trzyma się pojedynczo albo z kilkoma samicami.

Rodzina: Dactyloidae Nazwa angielska: Green Anole Dawna nazwa: *Ameiua bullaris; Anolis baccatus; Anolis podargicus; Anolius carolinensis; Norops baccatus*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**12-20 cm** długość całkowita z ogonem
Waga	**2-6 g**
Długość życia	**4-8 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny**
Środowisko	**Lasy i łąki strefy umiarkowanej**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 60 × 60 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**22-28 °C**
Miejsce wygrzewania	**30-35 °C**
Temperatura w nocy	**18-24 °C**
Wilgotność	**60-70%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 2
Pokarm	**Owady**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub jeden samiec z kilkoma samicami**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**4-12 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**1-2 jaj**
Zniesienia w roku	**6-10**
Inkubacja	**35-49 dni** przy 28-30 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Pojedynczy anolis potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 60 × 60 × 60 cm (długość × szerokość × wysokość). Większe jest lepsze, zwłaszcza na wysokość, bo gatunek się wspina i wykorzystuje całą przestrzeń.
TEMPERATURA	Miejsce do wygrzewania powinno mieć 30-35 °C, mierzone na gałęzi tuż pod lampą grzewczą. W pozostałej części terrarium utrzymuj w dzień 22-28 °C, a w nocy odpowiednie jest 18-24 °C.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza powinna wynosić średnio 60-70 %, niższa w środku dnia i wyższa w nocy. Zraszaj rośliny rano i wieczorem, żeby zwierzę mogło pić krople z liści.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek jest aktywny w dzień i potrzebuje codziennie mocnego światła i UVB. Wygrzewa się w półcieniu, a lampa UVB powinna zapewniać strefę Fergusona 2, czyli indeks UV najwyżej około 3 w miejscu do wygrzewania.
ŻYWIENIE	*Anolis carolinensis* jest owadożerny i bierze żywą, ruszającą się zdobycz.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Samce są terytorialne i demonstrują się, kiwając głową, rozkładając fałd gardłowy i nadymając się. Dwa samce w jednym terrarium walczą, a słabszy odnosi obrażenia albo ginie ze stresu.
NATURALNY ZASIĘG	Stany Zjednoczone.