herpy

LEGWANY

## Legwan czarny

# *Ctenosaura similis*

*Ctenosaura similis* to największy gatunek w rodzaju *Ctenosaura*: masywny, szybki i aktywny za dnia legwan z Meksyku i Ameryki Środkowej, z ogonem opasanym pierścieniami ostrych łusek i grzebieniem wzdłuż grzbietu. Dorasta do 130 cm, jako dorosły jest głównie roślinożerny i rzadko staje się oswojony. Wymaga bardzo dużego terrarium, silnego ogrzewania i UVB, a może żyć ponad 20 lat.

Rodzina: Iguanidae  Nazwa angielska: Black Spiny-tailed Iguana  Dawna nazwa: *Ctenosaura completa; Iguana similis*

### NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

#### ZWIERZĘ

| | |
|---|---|
| Wielkość dorosłego osobnika | **80-130 cm**<br>długość całkowita z ogonem |
| Długość życia | **15-25 lat** |
| Aktywność | **Za dnia** |
| Tryb życia | **Nadrzewny, skalny i naziemny** |
| Środowisko | **Sawanna, suchy las i tereny skaliste** |
| Trudność | **Doświadczony** |

#### HODOWLA

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **200 × 150 × 130 cm**<br>D × S × W dla 2 dorosłych osobników |
| Temperatura w dzień | **28-33 °C** |
| Miejsce wygrzewania | **40-45 °C** |
| Temperatura w nocy | **18-24 °C** |
| Wilgotność | **50-80%** |
| Woda | **Miska z wodą** |
| UVB | **Niezbędne**<br>Strefa Fergusona 3 |
| Pokarm | **Owady, owoce i rośliny** |
| Utrzymanie | **Pojedynczo, w parach lub jeden samiec z kilkoma samicami** |

#### ROZMNAŻANIE

| | |
|---|---|
| Rozmnażanie | **Jajorodny** |
| Dojrzałość płciowa | **21-48 miesięcy** |
| Wielkość zniesienia | **12-88 jaj** |
| Zniesienia w roku | **1** |
| Inkubacja | **90-120 dni**<br>przy 28-30 °C |

#### OCHRONA I FORMALNOŚCI

| | |
|---|---|
| CITES | **Załącznik II** |
| Załącznik unijny | **Załącznik B** |
| IUCN | **Najmniejszej troski (LC)** |

## Hodowla w skrócie

| | |
|---|---|
| **TERRARIUM** | Para dorosłych zwierząt potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 200 × 150 × 130 cm (długość × szerokość × wysokość). W praktyce oznacza to terrarium budowane na zamówienie lub mały pokój. |
| **TEMPERATURA** | Temperatura powietrza w terrarium powinna wynosić 28-33 °C w dzień i 18-24 °C w nocy. |
| **WILGOTNOŚĆ I WODA** | Wilgotność względna powinna wynosić około 50-60 % w dzień i 70-80 % w nocy. Wartości te dotyczą całego rodzaju. |
| **OŚWIETLENIE I UVB** | Gatunek jest aktywny za dnia i wymaga zarówno silnego światła, ciepła, jak i UVB. |
| **ŻYWIENIE** | Dorosłe zwierzęta jedzą głównie rośliny. |
| **ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM** | *Ctenosaura similis* jest płochliwy i broni się, a tylko nieliczne osobniki stają się na tyle oswojone, by można je było wyjmować z terrarium. |
| **NATURALNY ZASIĘG** | Meksyk, Belize, Gwatemala, Salwador, Honduras, Nikaragua, Kostaryka i Panama. |