herpy

LEGWANY

Frynosoma rogata

Phrynosoma cornutum

Phrynosoma cornutum to szeroka, spłaszczona jaszczurka z rogami na głowie i dwoma rzędami ostrych łusek wzdłuż boków. Żyje na otwartych, suchych terenach trawiastych i w zaroślach na południu USA i północy Meksyku. Osiąga 7-13 cm od pyska do kloaki, jest aktywna w dzień i żywi się głównie mrówkami. Właśnie pokarm stanowi główną przeszkodę: trudno go zastąpić, a gatunek należy do najtrudniejszych jaszczurek w hodowli terraryjnej.

Rodzina: Phrynosomatidae Nazwa angielska: Texas horned lizard Dawna nazwa: *Agama cornuta; Phrynosoma brevicornis; Phrynosoma bufonium; Phrynosoma harlanii; Phrynosoma planiceps*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**7-13 cm** długość od pyska do kloaki
Waga	**25-90 g**
Długość życia	**7-9 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny i kopiący nory**
Środowisko	**Półpustynia i sawanna**
Trudność	**Ekspert**

HODOWLA

Min. terrarium	**100 × 50 × 40 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**27-29 °C**
Miejsce wygrzewania	**38-42 °C**
Temperatura w nocy	**18-22 °C**
Wilgotność	**20-40%**
Woda	**Bez miski z wodą**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Owady**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**24 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**14-37 jaj**
Zniesienia w roku	**1**
Inkubacja	**40-61 dni** przy 27-30 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o hodowli *Phrynosoma cornutum* jest skąpa. Warunki opierają się więc na naturalnym środowisku: otwartym, suchym terenie, luźnej glebie, silnym słońcu i diecie z mrówek.
TEMPERATURA	Gatunek uwielbia słońce i potrzebuje miejsca do wygrzewania, w którym powierzchnia osiąga 38-42 °C, mierzone termometrem na podczerwień.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza musi być niska, 20-40 %, a terrarium powinno całkowicie wysychać w ciągu dnia. Podłoże nie może być mokre. Gatunek prawie nie pije z miski, lecz zlizuje rosę i krople deszczu z roślin i własnego ciała.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek jest aktywny w dzień i spędza go w pełnym słońcu, dlatego potrzebuje silnego światła i UVB przez cały rok.
ŻYWIENIE	Pokarm jest czynnikiem decydującym. W naturze około 70 % pokarmu to mrówki żniwiarki (*Pogonomyrmex*), a młode jedzą wyłącznie małe mrówki. Resztę stanowią termity, chrząszcze i szarańczaki.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Phrynosoma cornutum* jest spokojna i cicha, żyje samotnie. Nie rzuca się w oczy i łatwo ją przeoczyć, bo zlewa się z podłożem. Porusza się krótkimi odcinkami, unosi przód ciała i rozgląda się.
NATURALNY ZASIĘG	Stany Zjednoczone i Meksyk.