herpy

LEGWANY

## Emerald Swift

# *Sceloporus malachiticus*

*Sceloporus malachiticus* to mała, zwinna jaszczurka z chłodnych lasów górskich Ameryki Środkowej. Samiec jest szmaragdowozielony z niebieskimi plamami na brzuchu, samica brązowa z ciemnymi plamkami. Gatunek jest aktywny w dzień, żywi się owadami i zarówno wspina się, jak i biega po ziemi. Wymaga dobrze oświetlonego terrarium z UVB, ciepłego miejsca do wygrzewania, wilgotnego powietrza i chłodniejszych nocy. Rodzi żywe młode i trudno go zaaklimatyzować.

Rodzina: Phrynosomatidae

### NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

#### ZWIERZĘ

| | |
|---|---|
| Wielkość dorosłego osobnika | **15-25 cm**<br>długość całkowita z ogonem |
| Długość życia | **3-5 lat** |
| Aktywność | **Za dnia** |
| Tryb życia | **Nadrzewny, skalny i naziemny** |
| Środowisko | **Las górski i tereny skaliste** |
| Trudność | **Doświadczony** |

#### HODOWLA

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **90 × 45 × 60 cm**<br>D × S × W dla 1 dorosłego osobnika |
| Temperatura w dzień | **24-29 °C** |
| Miejsce wygrzewania | **33-37 °C** |
| Temperatura w nocy | **16-20 °C** |
| Wilgotność | **60-80%** |
| Woda | **Miska z wodą** |
| UVB | **Niezbędne**<br>Strefa Fergusona 3 |
| Pokarm | **Owady** |
| Utrzymanie | **Pojedynczo lub jeden samiec z kilkoma samicami** |

#### ROZMNAŻANIE

| | |
|---|---|
| Rozmnażanie | **Żyworodny** |
| Dojrzałość płciowa | **12-18 miesięcy** |
| Wielkość miotu | **2-10 młodych** |
| Ciąża | **90-120 dni** |

#### OCHRONA I FORMALNOŚCI

| | |
|---|---|
| CITES | **Niewymieniony** |
| Załącznik unijny | **Niewymieniony** |
| IUCN | **Najmniejszej troski (LC)** |

## Hodowla w skrócie

**TERRARIUM**

Wiedza o hodowli *Sceloporus malachiticus* jest skąpa i opiera się w dużej mierze na klimacie lasów górskich. Dorosły osobnik potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 90 × 45 × 60 cm (długość × szerokość × wysokość).

**TEMPERATURA**

*Sceloporus malachiticus* pochodzi z chłodniejszych wysokości i nie należy mu zapewniać tak wysokich temperatur jak pustynnym gatunkom z tego rodzaju. Powietrze powinno mieć w dzień 24-29 °C.

**WILGOTNOŚĆ I WODA**

Wilgotność powietrza powinna wynosić 60-80 %. Zraszaj rośliny i wystrój rano i wieczorem, aby były krople do picia, a podłoże utrzymuj wilgotne, ale nie mokre.

**OŚWIETLENIE I UVB**

*Sceloporus malachiticus* jest aktywny w dzień i wygrzewa się w środku dnia, więc potrzebuje UVB. Użyj świetlówki T5 HO (strefa Fergusona 3) w odbłyśniku nad miejscem do wygrzewania.

**ŻYWIENIE**

Gatunek jest owadożerny, ale zjada też trochę liści. Podawaj żywe owady: świerszcze, karaczany, małe szarańcze, mączniki, jedwabniki i larwy muchy czarnej, nie większe niż głowa zwierzęcia.

**ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM**

Zwierzę jest płochliwe i zwinne, źle znosi branie do ręki, dlatego ogranicz to do minimum. Nigdy nie chwytaj za ogon, bo może się odłamać. Samce są terytorialne i nie mogą mieszkać razem.

**NATURALNY ZASIĘG**

Gwatemala, Salwador, Nikaragua, Kostaryka i Panama.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/legwany/sceloporus-malachiticus