herpy

PADALCOWATE

Fringed Arboreal Alligator Lizard

Abronia fimbriata

Abronia fimbriata to brązowa, nadrzewna jaszczurka z rodziny padalcowatych, z kolcowatymi łuskami nad uchem, pochodząca z lasów mglistych północno-wschodnich wyżyn Gwatemali. Dorasta do około 25-35 cm, rodzi żywe młode i żywi się owadami. Wymaga wysokiego, przewiewnego terrarium z mchem i bromeliami oraz chłodnych temperatur. Gatunek jest zagrożony, a jego hodowla jest słabo opisana.

Rodzina: Anguidae Dawna nazwa: *Barissia fimbriata; Gerrhonotus fimbriatus*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**25-35 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**10-20 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny**
Środowisko	**Las górski**
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**50 × 50 × 75 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**20-27 °C**
Miejsce wygrzewania	**26-30 °C**
Temperatura w nocy	**10-18 °C**
Wilgotność	**60-80%**
Woda	**Bez miski z wodą**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 2
Pokarm	**Owady i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Żyworodny**
Dojrzałość płciowa	**24-36 miesięcy**
Wielkość miotu	**4 młodych**
Zniesienia w roku	**1**
Ciąża	**180-240 dni**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik I**
Załącznik unijny	**Załącznik A**
IUCN	**Zagrożony (EN)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Hodowla *Abronia fimbriata* jest opisana tylko w niewielkim stopniu, a podane tu wartości zapożyczono od blisko spokrewnionej *Abronia graminea*, najlepiej poznanego gatunku w rodzaju.
TEMPERATURA	*Abronia fimbriata* nie toleruje upału. Temperatura w dzień powinna wynosić 20-27 °C, a miejsce do wygrzewania pod słabą żarówką punktową może mieć 26-30 °C. Zwierzę jest najbardziej aktywne w temperaturze 24-27 °C.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność względna powietrza powinna wynosić 60-80 %, z najwyższymi wartościami w nocy i po zraszaniu.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek jest aktywny w dzień i potrzebuje UVB.
ŻYWIENIE	*Abronia fimbriata* żywi się owadami i innymi drobnymi bezkręgowcami. Podawaj świerszcze, szarańczę, mączniki, karaczany, ślimaki, pająki i miękkie larwy, np. zielone gąsienice motyli oraz larwy much o wysokiej zawartości wapnia.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Gatunek jest spokojny i płochliwy. Zwierzę spędza większość dnia, siedząc nieruchomo na gałęzi lub w bromelii, i wygrzewa się przez krótkie okresy. Nie jest to zwierzę do brania na ręce.
NATURALNY ZASIĘG	Gwatemala.