herpy

PADALCOWATE

Banded Arboreal Alligator Lizard

Abronia taeniata

Abronia taeniata to nadrzewna jaszczurka z rodziny padalcowatych o wyraźnych ciemnych poprzecznych pręgach, pochodząca z lasów górskich wschodniego Meksyku. Dorasta do około 25-35 cm, rodzi żywe młode i żywi się owadami. Wymaga wysokiego, przewiewnego terrarium z mchem i bromeliami oraz chłodnych temperatur. Gatunek jest narażony na wyginięcie w naturze i najlepiej sprawdzi się u doświadczonych hodowców.

Rodzina: Anguidae Dawna nazwa: *Gerrhonotus taeniatus*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**25-35 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**10-20 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny**
Środowisko	**Las górski**
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**50 × 50 × 75 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**20-27 °C**
Miejsce wygrzewania	**26-30 °C**
Temperatura w nocy	**10-18 °C**
Wilgotność	**60-80%**
Woda	**Bez miski z wodą**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 2
Pokarm	**Owady i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Żyworodny**
Dojrzałość płciowa	**24-36 miesięcy**
Wielkość miotu	**3-10 młodych**
Zniesienia w roku	**1**
Ciąża	**180-240 dni**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Narażony (VU)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Hodowla *Abronia taeniata* jest opisana jedynie skąpo, a podane tu wartości zapożyczono od blisko spokrewnionej *Abronia graminea*, najlepiej poznanego gatunku w rodzaju.
TEMPERATURA	*Abronia taeniata* nie znosi upału. Temperatura w dzień powinna wynosić 20-27 °C, a miejsce do wygrzewania pod słabym punktowym źródłem światła może mieć 26-30 °C. Zwierzę jest najbardziej aktywne przy 24-27 °C.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność względna powinna wynosić 60-80 %, z najwyższymi wartościami w nocy i po zraszaniu.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek jest dzienny i potrzebuje UVB. Najlepsze jest naturalne, niefiltrowane światło słoneczne, np. w siatkowej klatce na zewnątrz w suche letnie dni, z cieniem i chłodnym podłożem, aby zwierzę mogło zmieniać miejsce.
ŻYWIENIE	*Abronia taeniata* żywi się owadami i innymi drobnymi bezkręgowcami. Podawaj świerszcze, szarańczaki, mącznika, karaczany, ślimaki, pająki i miękkie larwy, np. zielone gąsienice motyli oraz larwy much o wysokiej zawartości wapnia.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Gatunek jest spokojny i płochliwy. Zwierzę spędza większość dnia, siedząc nieruchomo na gałęzi lub w bromelii, i wygrzewa się przez krótkie okresy. Nie jest to zwierzę do brania na ręce.
NATURALNY ZASIĘG	Meksyk.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/padalce/abronia-taeniata