herpy

PADALCOWATE

Padalec zwyczajny

Anguis fragilis

Anguis fragilis to beznoga, błyszcząca jaszczurka o długości 40-50 cm, która żyje w ukryciu pod kamieniami, drewnem i w gęstej roślinności w zachodniej i środkowej Europie. Przypomina węża, ale ma powieki i potrafi odrzucać ogon. Żywi się ślimakami i dżdżownicami, rodzi żywe młode i może dożyć bardzo sędziwego wieku. Wymaga chłodnego, wilgotnego terrarium lub wybiegu zewnętrznego z głębokim podłożem, wieloma kryjówkami i prawdziwym zimowaniem.

Rodzina: Anguidae Nazwa angielska: Slow Worm

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**40-50 cm** długość całkowita z ogonem
Waga	**20-100 g**
Długość życia	**20-30 lat**
Aktywność	**Za dnia i o zmierzchu**
Tryb życia	**Naziemny i kopiący nory**
Środowisko	**Lasy i łąki strefy umiarkowanej**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**80 × 40 × 40 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**18-24 °C**
Miejsce wygrzewania	**25-30 °C**
Temperatura w nocy	**10-15 °C**
Wilgotność	**60-80%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Opcjonalne**
Zimowanie	**4-8 °C** 16-20 tygodni
Pokarm	**Owady i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**W parach lub jeden samiec z kilkoma samicami**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Żyworodny**
Dojrzałość płciowa	**36-48 miesięcy**
Wielkość miotu	**6-12 młodych**
Zniesienia w roku	**1**
Ciąża	**80-100 dni**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Hodowla *Anguis fragilis* jest opisana jedynie skąpo, ale gatunek jest odporny i chętnie się rozmnaża, gdy warunki są odpowiednie. Podane tu wartości opierają się na trybie życia gatunku i klimacie.
TEMPERATURA	Gatunek nie znosi silnego ciepła. Temperatura w dzień powinna wynosić 18-24 °C.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza powinna wynosić 60-80 %. Podłoże ma być lekko wilgotne w głębi, ale nigdy mokre, a jego wierzchnia warstwa może między zraszaniami nieco przeschnąć.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek jest najaktywniejszy rano i o zmierzchu i wygrzewa się głównie pośrednio.
ŻYWIENIE	*Anguis fragilis* żywi się powolnymi ofiarami i ponad wszystko przedkłada małe, szare pomrowiki. Przyjmuje też inne nagie ślimaki, dżdżownice, larwy koziułek, białe robaki, pająki i małe ślimaki z muszlą.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Anguis fragilis* jest spokojny i większość czasu spędza w podłożu lub pod kryjówkami, często wystawiając tylko głowę.
NATURALNY ZASIĘG	Norwegia, Szwecja, Dania, Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Luksemburg, Niemcy, Francja, Hiszpania, Portugalia, Szwajcaria, Liechtenstein, Austria, Czechy, Polska, Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Serbia i Macedonia Północna.