herpy

PADALCOWATE

Iberian Worm Lizard

Blanus cinereus

Blanus cinereus to beznoga amfisbena z Półwyspu Iberyjskiego, która całe życie spędza pod ziemią, w luźnej, bogatej w próchnicę glebie i pod kamieniami. Zwierzę mierzy 15-25 cm od pyska do kloaki i ma ciało podzielone na pierścienie, zaokrąglony pysk i niemal ślepe oczy. Gatunek składa 1-2 jaja rocznie i wymaga głębokiego, lekko wilgotnego podłoża, równomiernego ogrzewania od spodu i spokoju. Wiedza o hodowli jest bardzo skąpa.

Rodzina: Blanidae Dawna nazwa: *Amphisbaena cinerea; Blanus mariae*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**15-25 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**5-10 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Kopiący nory**
Środowisko	**Lasy i łąki strefy umiarkowanej**
Trudność	**Ekspert**

HODOWLA

Min. terrarium	**40 × 30 × 30 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**20-24 °C**
Temperatura w nocy	**15-20 °C**
Wilgotność	**50-70%**
Woda	**Bez miski z wodą**
UVB	**Niewymagane**
Pokarm	**Owady**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**1-3 jaj**
Zniesienia w roku	**1**
Inkubacja	**60-90 dni** przy 22-26 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o hodowli *Blanus cinereus* jest bardzo skąpa.
TEMPERATURA	Zwierzęta ogrzewają się, leżąc zakopane w nagrzanej glebie, a nie w cieple światła. Podłoże powinno mieć w dzień 20-24 °C, w jednym końcu nieco cieplej niż w drugim.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Liczy się wilgotność podłoża, nie powietrza. Podłoże powinno być lekko do umiarkowanie wilgotne, ale nie mokre: ściśnięte w dłoni ma zachować kształt, nie klejąc się ani nie ociekając. Codziennie lekko zraszaj podłoże wodą.
OŚWIETLENIE I UVB	Zwierzęta leżą zakopane i nie pokazują się w świetle. UVB nie jest potrzebne.
ŻYWIENIE	*Blanus cinereus* żywi się owadami i ich larwami. Dobrym pokarmem są poczwarki i larwy mącznika oraz małe, świeżo zabite świerszcze, oprószone preparatem multiwitaminowym. Kładź pokarm pod płytkę trzy razy w tygodniu.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Blanus cinereus* rzadko się pokazuje. Zwierzęta leżą zakopane i wychodzą jedynie pod płytkę. To normalne. Nie odkopuj zwierząt, by je sprawdzić: stres sprawia, że mniej się poruszają i korzystają z mniejszego obszaru.
NATURALNY ZASIĘG	Hiszpania, Portugalia i Gibraltar.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/padalce/blanus-cinereus