herpy

PADALCOWATE

Heloderma arizońska

Heloderma suspectum

Heloderma suspectum to masywna, powolna jaszczurka z pustyń południowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych i północno-zachodniego Meksyku, czarna z różowymi lub żółtymi pasami i pokryta perełkowatymi łuskami. Jest jadowita: ugryzienie to nagły stan zagrożenia zdrowia, a gatunek wymaga doświadczenia, stałych nawyków i bezpiecznego postępowania. Osiąga 35-55 cm, kopie, żywi się jajami i małymi kręgowcami i może dożyć ponad 20 lat.

Rodzina: Helodermatidae Nazwa angielska: Gila Monster

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**35-55 cm** długość całkowita z ogonem
Waga	**500-800 g**
Długość życia	**20-30 lat**
Aktywność	**Za dnia i o zmierzchu**
Tryb życia	**Skalny, naziemny i kopiący nory**
Środowisko	**Pustynia, półpustynia i tereny skaliste**
Trudność	**Ekspert**

HODOWLA

Min. terrarium	**150 × 70 × 50 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**22-32 °C**
Temperatura w nocy	**20-24 °C**
Wilgotność	**40-60%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 2
Zimowanie	**10-15 °C** 13-17 tygodni
Pokarm	**Kręgowce**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**36-60 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**3-7 jaj**
Zniesienia w roku	**1**
Inkubacja	**134-155 dni** przy 26-29 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Bliski zagrożenia (NT)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Dorosły osobnik potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 150 × 70 × 50 cm (długość × szerokość × wysokość). Wymiary te są szacunkiem opartym na wielkości i trybie życia zwierzęcia.
TEMPERATURA	W dzień w terrarium musi być gradient od 22 °C w chłodnym końcu do 32 °C pod lampą grzewczą, tak aby zwierzę samo mogło wybierać. Aktywne osobniki utrzymują temperaturę ciała około 30 °C. Nocą temperatura spada do 20-24 °C.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza wynosi 40-60 %, a część podłoża utrzymuje się lekko wilgotną, aby zwierzę mogło zakopać się w wilgotniejszej ziemi.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek jest aktywny w dzień i o zmierzchu. Światło włącza się na 10-13 godzin dziennie, najkrócej w okresach przed zimowaniem i po nim, a w trakcie zimowania jest wyłączone.
ŻYWIENIE	W naturze gatunek zjada małe ssaki, pisklęta z gniazd, ptaki, jaszczurki, węże, żaby i owady, a zwłaszcza jaja ptaków i gadów. Zjada kilka dużych posiłków w roku i żyje z tłuszczu zgromadzonego w ogonie i jamie brzusznej.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	BEZPIECZEŃSTWO: zwierzę jest jadowite, a największym błędem jest poleganie na tym, że jest powolne i oswojone. Ugryzienie następuje bez ostrzeżenia, także ze strony zwierzęcia, które od lat bierze pokarm z pęsety.
NATURALNY ZASIĘG	Stany Zjednoczone i Meksyk.