herpy

PADALCOWATE

Eastern Glass Lizard

Ophisaurus ventralis

Ophisaurus ventralis to długa, beznoga jaszczurka z rodziny padalcowatych, pochodząca z nizin nadbrzeżnych południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych. Osiąga do około 108 cm długości, z czego ponad dwie trzecie przypada na ogon, i prowadzi skryty tryb życia w wilgotnych, piaszczystych lasach i na łąkach. Przypomina węża. Wymaga przestronnego terrarium z głębokim podłożem, w którym może kopać, miejsca do wygrzewania i urozmaiconej diety złożonej z owadów, ślimaków i dżdżownic.

Rodzina: Anguidae

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**45-108 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**4-15 lat**
Aktywność	**Za dnia i o zmierzchu**
Tryb życia	**Naziemny i kopiący nory**
Środowisko	**Sawanna i mokradła**
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**22-29 °C**
Miejsce wygrzewania	**30-32 °C**
Temperatura w nocy	**18-22 °C**
Wilgotność	**60-75%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 2
Zimowanie	**12-16 °C** 6-10 tygodni
Pokarm	**Owady, kręgowce i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**24 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**5-17 jaj**
Zniesienia w roku	**1**
Inkubacja	**50-65 dni** przy 26-29 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o hodowli *Ophisaurus ventralis* jest skąpa, a gatunek jest rzadko utrzymywany.
TEMPERATURA	Temperatura w dzień powinna wynosić 22-29 °C, z miejscem do wygrzewania o temperaturze 30-32 °C mierzonej na powierzchni termometrem na podczerwień i około 24 °C w chłodnej części.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza powinna wynosić 60-75 %. Gatunek żyje na wilgotnym, piaszczystym podłożu, więc część podłoża powinna być lekko wilgotna, a reszta wysychać, tak by zwierzę mogło wybierać.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek wygrzewa się w naturze i preferuje półcień. Zapewnij świetlówkę UVB w strefie Fergusona 2 nad miejscem do wygrzewania, aby zwierzę mogło samo decydować o wejściu w światło, oraz indeks UV 2-3 w miejscu do wygrzewania.
ŻYWIENIE	*Ophisaurus ventralis* jest oportunistycznym drapieżnikiem, który zjada głównie owady i inne drobne zwierzęta, ale także ślimaki, dżdżownice, małe węże i jaja.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Ophisaurus ventralis* jest spokojny, ale nie lubi być brany do ręki. Schwytany wije się, może ugryźć i łatwo odrzuca ogon, dlatego nigdy nie podnoś zwierzęcia za ogon.
NATURALNY ZASIĘG	Stany Zjednoczone.