herpy

SALAMANDRY I TRASZKI

## Ambystoma plamista

# *Ambystoma maculatum*

*Ambystoma maculatum* to masywna salamandra o długości 15-25 cm z lasów liściastych Ameryki Północnej, czarna lub ciemnoszara, z dwoma rzędami dużych żółtych do pomarańczowych plam wzdłuż grzbietu. Dorosłe osobniki żyją ukryte pod liśćmi i drewnem oraz w norach w ziemi i wychodzą nocą, a jaja i larwy rozwijają się w leśnych stawach bez ryb. Gatunek jest spokojny i najlepiej czuje się w chłodzie.

Rodzina: Ambystomatidae  Nazwa angielska: Spotted Salamander  **Słabe toksyny skórne**

### NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

#### ZWIERZĘ

| | |
|---|---|
| Wielkość dorosłego osobnika | **15-25 cm**<br>długość całkowita z ogonem |
| Długość życia | **15-25 lat** |
| Aktywność | **W nocy** |
| Tryb życia | **Naziemny i kopiący nory** |
| Środowisko | **Lasy i łąki strefy umiarkowanej** |
| Toksyny skórne | **Słabe**<br>Umyj ręce po kontakcie i trzymaj palce z dala od oczu i ust |
| Trudność | **Początkujący** |

#### HODOWLA

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **50 × 30 × 30 cm**<br>D × S × W dla 1 dorosłego osobnika |
| Temperatura w dzień | **14-20 °C** |
| Temperatura w nocy | **10-16 °C** |
| Wilgotność | **80-95%** |
| Woda | **Miska z wodą** |
| UVB | **Niewymagane** |
| Pokarm | **Owady i dżdżownice i ślimaki** |
| Utrzymanie | **Pojedynczo lub w parach** |

#### ROZMNAŻANIE

| | |
|---|---|
| Rozmnażanie | **Jajorodny** |
| Rozwój | **Larwy w wodzie** |
| Miejsce składania jaj | **W wodzie** |
| Dojrzałość płciowa | **24-84 miesięcy** |
| Liczba jaj w zniesieniu | **100-370** |
| Czas do wyklucia | **28-49 dni** |
| Okres larwalny | **60-120 dni**<br>od wyklucia do metamorfozy |
| Pokarm larw | **Inne larwy i małe bezkręgowce wodne (rozwielitki, larwy komarów)** |
| Opieka nad potomstwem | **Brak** |

#### OCHRONA I FORMALNOŚCI

| | |
|---|---|
| CITES | **Niewymieniony** |
| Załącznik unijny | **Niewymieniony** |
| IUCN | **Najmniejszej troski (LC)** |

## Hodowla w skrócie

| | |
|---|---|
| **TERRARIUM** | Jednemu dorosłemu osobnikowi wystarczy powierzchnia dna 50 × 30 cm, dwóm dorosłym co najmniej 75 × 30 cm. Powierzchnia dna jest ważniejsza niż wysokość, a 30 cm wysokości w zupełności wystarczy. |
| **TEMPERATURA** | W dzień temperatura powinna wynosić 14-20 °C, a w nocy 10-16 °C. Gatunek lubi chłód i jest najbardziej aktywny w 10-21 °C. |
| **WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE** | Podłoże musi być wilgotne, ale nigdy mokre ani błotniste, bo zwierzę wchłania wodę przez skórę i nie pije pyskiem. Wilgotne podłoże zapewnia 80-95 % wilgotności powietrza. |
| **WODA I JAKOŚĆ WODY** | Płytka, ciężka miska z wodą to dobre zabezpieczenie: jeśli podłoże za bardzo wyschnie, zwierzę może się w niej położyć. |
| **OŚWIETLENIE I UVB** | Gatunek prowadzi nocny tryb życia i żyje ukryty pod ziemią, więc nie potrzebuje specjalnego oświetlenia ani UVB. |
| **ŻYWIENIE** | Dorosłe osobniki jedzą dżdżownice, czerwone robaki kompostowe, świerszcze, karaczany i małe ślimaki. |
| **ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM** | Dorosłe osobniki większość czasu spędzają w ukryciu i wychodzą nocą na polowanie. Gatunek jest spokojny i rzadko gryzie. |
| **NATURALNY ZASIĘG** | Kanada i Stany Zjednoczone. |

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/plazy-ogoniaste/ambystoma-maculatum