herpy

SALAMANDRY I TRASZKI

Western Tiger Salamander

Ambystoma mavortium

Ambystoma mavortium to masywna, osiągająca do 30-35 cm długości salamandra z prerii, lasów i półpustyń Ameryki Północnej, z żółtymi poprzecznymi pasami i plamami na ciemnym tle. Larwy żyją w wodzie, natomiast dorosłe osobniki spędzają większość życia w samodzielnie wykopanych norach i wychodzą na powierzchnię nocą. Niektóre osobniki nigdy nie przechodzą przeobrażenia i osiągają dojrzałość płciową, zachowując skrzela.

Rodzina: Ambystomatidae

Słabe toksyny skórne

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**15-30 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**10-20 lat**
Aktywność	**W nocy**
Tryb życia	**Naziemny i kopiący nory**
Środowisko	**Półpustynia i lasy i łąki strefy umiarkowanej**
Toksyny skórne	**Słabe** Umyj ręce po kontakcie i trzymaj palce z dala od oczu i ust
Trudność	**Początkujący**

HODOWLA

Min. terrarium	**50 × 25 × 30 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**18-22 °C**
Temperatura w nocy	**16-20 °C**
Wilgotność	**80-95%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Niewymagane**
Pokarm	**Owady, kręgowce i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Larwy w wodzie**
Miejsce składania jaj	**W wodzie**
Dojrzałość płciowa	**5-36 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**100-1 000**
Czas do wyklucia	**19-50 dni**
Okres larwalny	**75-150 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Inne larwy i małe bezkręgowce wodne (rozwielitki, larwy komarów)**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Dorosłe osobniki można trzymać w wielu rodzajach zbiorników.
TEMPERATURA	Temperatura powinna wynosić 18-22 °C w dzień, a nocą najlepiej nieco mniej, zarówno dla larw, jak i dla dorosłych. Gatunek lepiej znosi chłód niż ciepło. Zbiornika z larwami nie ogrzewa się, a woda nie może przekraczać 24 °C.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Podłoże musi być wilgotne, ale nigdy mokre ani błotniste, ponieważ zwierzę pobiera wodę przez skórę i nie pije pyskiem. Wilgotności powietrza dla tego gatunku nie zmierzono; wilgotne podłoże daje około 80-95 %.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Niska, ciężka miska z wodą nie jest konieczna, ale stanowi dobre zabezpieczenie: gdy podłoże za bardzo wyschnie, zwierzę schroni się w misce, co zapobiega śmierci z wysuszenia.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek prowadzi nocny tryb życia i nie potrzebuje specjalnego oświetlenia. Nic nie wskazuje na to, by potrzebował UVB, a silne światło UV może uszkodzić oczy i skórę płazów.
ŻYWIENIE	Larwy i osobniki neoteniczne jedzą dżdżownice, dżdżownice kompostowe, świerszcze odpowiedniej wielkości, larwy barciaka i małe ryby.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Dorosłe osobniki kopią i przez większość dnia pozostają w ukryciu. Są aktywne nocą i są aktywnymi łowcami, które czatują na zdobycz z zasadzki. Wiele zwierząt uczy się rozpoznawać opiekuna i żebrze o jedzenie.
NATURALNY ZASIĘG	Kanada, Stany Zjednoczone i Meksyk.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/plazy-ogoniaste/ambystoma-mavortium