herpy

SALAMANDRY I TRASZKI

Ambystoma tygrysia

Ambystoma tigrinum

Ambystoma tigrinum to masywna salamandra ze wschodniej połowy USA, mierząca zwykle 15-20 cm, z żółtymi do oliwkowozielonych plamami na brązowym do czarnego tle. Larwy żyją w wodzie, a dorosłe osobniki spędzają większość życia w samodzielnie wykopanych norach i wychodzą na powierzchnię nocą. Niektóre osobniki nigdy nie przechodzą przeobrażenia i osiągają dojrzałość płciową, zachowując skrzela.

Rodzina: Ambystomatidae Nazwa angielska: Eastern Tiger Salamander **Słabe toksyny skórne**

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**15-33 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**12-20 lat**
Aktywność	**W nocy**
Tryb życia	**Naziemny i kopiący nory**
Środowisko	**Lasy i łąki strefy umiarkowanej**
Toksyny skórne	**Słabe** Umyj ręce po kontakcie i trzymaj palce z dala od oczu i ust
Trudność	**Początkujący**

HODOWLA

Min. terrarium	**50 × 25 × 30 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**18-22 °C**
Temperatura w nocy	**16-22 °C**
Wilgotność	**80-95%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Niewymagane**
Pokarm	**Owady, kręgowce i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Larwy w wodzie**
Miejsce składania jaj	**W wodzie**
Dojrzałość płciowa	**5-48 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**100-1 000**
Czas do wyklucia	**12-50 dni**
Okres larwalny	**75-150 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Inne larwy i małe bezkręgowce wodne (rozwielitki, larwy komarów)**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Dorosłe osobniki można trzymać w wielu rodzajach zbiorników. Najprostszy jest duży plastikowy pojemnik ze szczelną pokrywą i wieloma małymi otworami wentylacyjnymi; szklane terrarium z pokrywą z siatki zapewnia lepszy widok.
TEMPERATURA	*Ambystoma tigrinum* potrzebuje w dzień 18-22 °C, zarówno jako larwa, jak i jako dorosły osobnik, a nocą temperatura może spadać do 16 °C. Gatunek lepiej znosi chłód niż ciepło.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Podłoże musi być wilgotne, ale nigdy mokre ani błotniste, ponieważ zwierzę wchłania wodę przez skórę. Wilgotność powietrza dla tego gatunku nie jest udokumentowana; wartość 80-95 % przejęto od *Ambystoma mavortium*.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Dorosłe osobniki nie potrzebują części wodnej: słabo pływają i mogą się utopić. Niska, ciężka miska z wodą nie jest konieczna, ale stanowi dobre zabezpieczenie, bo gdy podłoże zbytnio przeschnie, zwierzę schroni się w misce.
OŚWIETLENIE I UVB	*Ambystoma tigrinum* prowadzi nocny tryb życia i nie potrzebuje specjalnego oświetlenia. Nie ma danych wskazujących, że gatunek potrzebuje UVB, a silne światło UV może uszkadzać oczy i skórę płazów.
ŻYWIENIE	Larwy i osobniki neoteniczne jedzą dżdżownice, czerwone robaki kompostowe, świerszcze odpowiedniej wielkości, larwy barciaka i małe ryby (nie złote rybki).
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Dorosłe osobniki kopią i przez większą część dnia pozostają ukryte. Są aktywne nocą i polują z zasadzki. Wiele osobników uczy się rozpoznawać opiekuna i żebrze o jedzenie.
NATURALNY ZASIĘG	Stany Zjednoczone.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/plazy-ogoniaste/ambystoma-tigrinum