herpy

SALAMANDRY I TRASZKI

Traszka zwyczajna

Lissotriton vulgaris

Lissotriton vulgaris to mała, łatwo przystosowująca się traszka o długości 8-11 cm, która przez większą część roku żyje na lądzie i wchodzi do wody tylko na czas rozrodu. Wiosną samiec zyskuje falisty grzebień grzbietowy i intensywne barwy. Gatunek jest odporny w chłodnym akwaterrarium z zimowaniem i chętnie składa jaja, dzięki czemu można obserwować cały cykl życiowy.

Rodzina: Salamandridae Nazwa angielska: Smooth Newt Dawna nazwa: *Triturus vulgaris* **Słabe toksyny skórne**

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**8-11 cm** długość całkowita z ogonem
Waga	**0,3-5,2 g**
Długość życia	**4-14 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Półwodny**
Środowisko	**Mokradła i lasy i łąki strefy umiarkowanej**
Toksyny skórne	**Słabe** Umyj ręce po kontakcie i trzymaj palce z dala od oczu i ust
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 30 × 30 cm** D × S × W dla 4 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**12-20 °C**
Temperatura w nocy	**8-15 °C**
Wilgotność	**80-100%**
Woda	**Akwaterrarium** głębokość 10-20 cm
Temperatura wody	**10-20 °C**
UVB	**Niewymagane**
Zimowanie	**5-10 °C** 8-12 tygodni
Pokarm	**Owady, małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe) i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Larwy w wodzie**
Miejsce składania jaj	**W wodzie**
Dojrzałość płciowa	**24-36 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**100-500**
Czas do wyklucia	**8-35 dni**
Okres larwalny	**42-120 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Małe bezkręgowce wodne (rozwielitki, larwy komarów)**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Dorosłe zwierzęta potrzebują zarówno części wodnej, jak i lądowej.
TEMPERATURA	*Lissotriton vulgaris* lubi chłód. Temperatura w dzień wynosi 12-20 °C, a w nocy 8-15 °C. Około 20 °C to najwyższa temperatura, jaką zwierzęta powinny mieć przez dłuższy czas, a aktywne pozostają nawet do około 5 °C.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Miękka skóra szybko wysycha, dlatego część lądowa musi być wilgotna, z wilgotnością powietrza 80-100 %.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Część wodna powinna mieć głębokość 10-20 cm i temperaturę 10-20 °C. Używaj odchlorowanej wody z kranu, wody z kranu odstanej przez kilka dni lub deszczówki; gatunek nie jest wybredny co do pH, ale chlor jest szkodliwy.
OŚWIETLENIE I UVB	UVB nie jest potrzebne temu gatunkowi, który żyje w ukryciu i jest aktywny o zmierzchu i w nocy. Zwierzęta unikają słońca.
ŻYWIENIE	*Lissotriton vulgaris* zjada wszystkie małe zwierzęta, które jest w stanie połknąć.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Gatunek jest pokojowy i można go trzymać w parach lub w grupach z przewagą samic nad samcami. W okresie rozrodu samce ścigają samice, więc więcej samic niż samców, dużo roślin i dobre kryjówki zapewniają spokój.
NATURALNY ZASIĘG	Irlandia, Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Austria, Szwajcaria, Włochy, Słowenia, Chorwacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Serbia, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Rosja i Kazachstan.