herpy

SALAMANDRY I TRASZKI

Guizhou Warty Newt

Paramesotriton caudopunctatus

Paramesotriton caudopunctatus to krępa, niemal całkowicie wodna salamandra osiągająca do 16 cm, pochodząca z górskich lasów południowo-środkowych Chin. Nazwa gatunkowa nawiązuje do drobnych plamek na ogonie. Gatunek rośnie wyjątkowo wolno, rzadko spotyka się go w niewoli i wymaga chłodnej, czystej wody.

Rodzina: Salamandridae

Słabe toksyny skórne

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**13-16 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**10-15 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Wodny**
Środowisko	**Las deszczowy, las górski i mokradła**
Toksyny skórne	**Słabe** Umyj ręce po kontakcie i trzymaj palce z dala od oczu i ust
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 30 × 35 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**16-22 °C**
Temperatura w nocy	**14-18 °C**
Wilgotność	**70-90%**
Woda	**Akwaterrarium** głębokość 15-20 cm
UVB	**Niewymagane**
Pokarm	**Owady i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**W parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Larwy w wodzie**
Miejsce składania jaj	**W wodzie**
Dojrzałość płciowa	**108-120 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**20-115**
Zniesienia w roku	**1**
Czas do wyklucia	**21-56 dni** przy 18-25 °C
Okres larwalny	**80-110 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Inne larwy i małe bezkręgowce wodne (rozwielitki, larwy komarów)**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Bliski zagrożenia (NT)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o hodowli *Paramesotriton caudopunctatus* jest skąpa, a gatunek rzadko spotyka się w niewoli.
TEMPERATURA	*Paramesotriton caudopunctatus* należy trzymać w chłodzie: 16-22 °C w dzień i 14-18 °C w nocy, a woda nie może nagrzać się powyżej 22 °C.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	*Paramesotriton caudopunctatus* jest niemal całkowicie wodny, więc wilgotność powietrza ma niewielkie znaczenie; 70-90 % w zupełności wystarczy. Część lądowa powinna być wilgotna, dopóki zwierzęta z niej korzystają.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Woda powinna mieć 15-20 cm głębokości. Używaj odchlorowanej wody z kranu lub wody źródlanej. Woda musi być czysta; unikaj skrajnych wartości pH i twardości.
OŚWIETLENIE I UVB	*Paramesotriton caudopunctatus* nie potrzebuje mocnego światła. Pojedyncza świetlówka lub listwa LED z wyłącznikiem czasowym zapewni stały rytm dobowy około 12 godzin. UVB nie jest konieczne.
ŻYWIENIE	*Paramesotriton caudopunctatus* je to samo co pozostali przedstawiciele rodzaju: pokrojone dżdżownice, świerszcze, świeżo wylinkowane mączniki, karaczany i kawałki krewetek.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Paramesotriton caudopunctatus* jest bardziej aktywny niż większość gatunków z rodzaju. Młode osobniki lądowe są natomiast bardzo skryte i rzadko się je widuje.
NATURALNY ZASIĘG	Chiny.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/plazy-ogoniaste/paramesotriton-caudopunctatus