herpy

SALAMANDRY I TRASZKI

## Paddle Tail Newt

# *Paramesotriton labiatus*

*Paramesotriton labiatus* to niemal całkowicie wodna salamandra, znana wyłącznie z gór Dayao w Kuangsi w południowych Chinach. Gatunek jest krytycznie zagrożony, a wiedza o jego hodowli praktycznie nie istnieje. Często bywa mylony z innymi zwierzętami, ponieważ salamandry oferowane w handlu pod nazwą *labiatus* należą do rodzaju *Pachytriton*.

Rodzina: Salamandridae  Dawna nazwa: *Pachytriton labiatus; Paramesotriton ermizhaoi*  **Słabe toksyny skórne**

### NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

#### ZWIERZĘ

| | |
|---|---|
| Wielkość dorosłego osobnika | **11-16 cm**<br>długość całkowita z ogonem |
| Długość życia | **10-15 lat** |
| Aktywność | **O zmierzchu i w nocy** |
| Tryb życia | **Wodny** |
| Środowisko | **Las deszczowy i mokradła** |
| Toksyny skórne | **Słabe**<br>Umyj ręce po kontakcie i trzymaj palce z dala od oczu i ust |
| Trudność | **Średnio zaawansowany** |

#### HODOWLA

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **60 × 30 × 35 cm**<br>D × S × W dla 2 dorosłych osobników |
| Temperatura w dzień | **16-22 °C** |
| Temperatura w nocy | **14-18 °C** |
| Wilgotność | **70-90%** |
| Woda | **Akwaterrarium**<br>głębokość 15-20 cm |
| UVB | **Niewymagane** |
| Pokarm | **Owady i dżdżownice i ślimaki** |
| Utrzymanie | **W parach** |

#### ROZMNAŻANIE

| | |
|---|---|
| Rozmnażanie | **Jajorodny** |
| Rozwój | **Larwy w wodzie** |
| Miejsce składania jaj | **W wodzie** |
| Liczba jaj w zniesieniu | **20-115** |
| Okres larwalny | **80-110 dni**<br>od wyklucia do metamorfozy |
| Pokarm larw | **Inne larwy i małe bezkręgowce wodne (rozwielitki, larwy komarów)** |
| Opieka nad potomstwem | **Brak** |

#### OCHRONA I FORMALNOŚCI

| | |
|---|---|
| CITES | **Załącznik II** |
| Załącznik unijny | **Załącznik B** |
| IUCN | **Krytycznie zagrożony (CR)** |

## Hodowla w skrócie

| | |
|---|---|
| **TERRARIUM** | Wiedza o hodowli *Paramesotriton labiatus* praktycznie nie istnieje. |
| **TEMPERATURA** | *Paramesotriton labiatus* należy trzymać w chłodzie, tak jak resztę rodzaju: 16-22 °C w dzień i 14-18 °C w nocy, a woda nie może być cieplejsza niż 22 °C. |
| **WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE** | *Paramesotriton labiatus* niemal cały czas przebywa w wodzie, więc wilgotność powietrza ma niewielkie znaczenie; 70-90 % w pomieszczeniu w zupełności wystarczy. |
| **WODA I JAKOŚĆ WODY** | Woda powinna mieć 15-20 cm głębokości. Używaj odchlorowanej wody z kranu lub wody źródlanej. Woda musi być czysta i dobrze natleniona, należy też unikać skrajnych wartości pH i twardości. |
| **OŚWIETLENIE I UVB** | *Paramesotriton labiatus* nie potrzebuje silnego oświetlenia. Pojedyncza świetlówka lub listwa LED podłączona do programatora czasowego zapewni stały rytm dobowy około 12 godzin. UVB nie jest konieczne. |
| **ŻYWIENIE** | *Paramesotriton labiatus* jest drapieżnikiem. |
| **ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM** | Gatunki z rodzaju *Paramesotriton* są na początku płochliwe, ale często stają się ufne i podpływają do przedniej szyby, gdy pojawia się jedzenie. Samce bywają kłótliwe, zwłaszcza w okresie godowym, a samice mogą walczyć o pokarm. |
| **NATURALNY ZASIĘG** | Chiny. |